

ナレート®水和剤

ナレートは日本農業(株)の登録商標です。
農林水産省登録 第17959号

オキシリニック酸：10.0% 有機銅：50.0%

軟腐病に対して予防効果の高い
オキシリニック酸(商品名 スターナ)と
幅広い細菌に対して有効な
8-ヒドロキシキノリン銅(有機銅)を
配合した薬剤です。



特長

- 1 軟腐病に特に優れた効果を示します
- 2 発病初期の防除で優れた予防効果と残効を示します
- 3 定植時から生育期に幅広く使えます

【適用病害と使用方法】

(2023年3月現在の登録内容)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	下記を含む農薬の総使用回数		使用 方法
						オキシリニク酸	有機銅	
ばれいしょ	軟腐病	600~1,000	100~300 ℓ/10a	収穫 14日前 まで	5回以内	5回以内 (種いも浸漬は1回以内)	5回以内	散布
キャベツ	黒腐病	800			3回以内	3回以内	3回以内	
ブロッコリー	軟腐病	1,000			2回以内	2回以内		
はくさい	黒斑病 白斑病 べと病	800		収穫 30日前 まで	3回以内	3回以内	5回以内	
だいこん	軟腐病	800~1,000		収穫21日前まで		5回以内	3回以内	
たまねぎ	べと病	800		収穫 14日前 まで		3回以内		
ねぎ	軟腐病			収穫 21日前 まで	2回以内	2回以内	5回以内	
レタス	腐敗病 斑点細菌病 すそ枯病	1,000			5回以内	6回以内 (種いもへの吹き付けは1回 以内、植付後は5回以内)	8回以内	
こんにゃく	腐敗病	800~1,000						
にんにく	春腐病	1,000		収穫7日前まで	2回以内	2回以内	5回以内	

【試験成績】

■ねぎ：軟腐病

鳥取県園芸試験場(1998)

品種：長宝 定植：4月28日 区制：1区5m ² 、2反復 散布：8月10日、19日、 28日、9月9日 の計4回 調査：10月2日に葉身 部の軟腐・腐敗 症状株の発病株 率を調査	供試薬剤	希釈倍数	発病株率(%)
	ナレート水和剤	1000倍	14.1
	A 剤	2000倍	26.6
	無散布		46.9

■レタス：軟腐病

長野県農事試験場原村試験地(1990)

品種：オリンピック 散布：6月28日、7月 10日、20日の 計3回 調査：7月26日に全株 を収穫し、程度 別発病株数を調 査して算出	供試薬剤	希釈倍数	発病度
	ナレート水和剤	1000倍	14.4
	B 剤	600倍	24.8
	無散布		62.4

■はくさい：軟腐病

長野県野菜花き試験場(1988)

品種：郷風 散布：9月22日、28日、 10月5日、14日 の計4回 調査：10月27日に発 病程度別に調査 し、算出	供試薬剤	希釈倍数	発病度
	ナレート水和剤	600倍	5.0
	ナレート水和剤	1000倍	6.7
	無散布		20.0

■レタス：腐敗病

長野県農事試験場原村試験地(1990)

品種：オリンピック 散布：6月28日、7月 10日、20日の 計3回 調査：7月26日に全株 を収穫し、程度 別発病株数を調 査して算出	供試薬剤	希釈倍数	発病度
	ナレート水和剤	1000倍	3.4
	B 剤	600倍	6.6
	無散布		16.7

使用上の注意



- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 石灰硫黄合剤との混用は薬害のおそれがあるのでさけてください。
- はくさい、レタス、キャベツに対して使用する場合、収穫間際の散布では収穫物に汚れを生じることがあるので注意してください。
- はくさい・たまねぎ・レタス・キャベツ・ブロッコリー・だいこん・ねぎの軟腐病、はくさいのべと病、レタスの斑点細菌病及び腐敗病並びににんにくの春腐病に使用する場合、発病後の散布では効果が劣る場合があるので、発病前あるいは発病初期に予防的に散布してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 誤飲、誤食などのないよう注意してください。
- 眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬

- 剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

■使用前にはラベルをよく読んでください。■ラベルの記載以外には使用しないでください。■小児の手の届く所には置かないでください。■空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

05R3C23N02:TO

2023年3月作成

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCA GROUP

住友化学

動画
チャンネルは
こちら！〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号
お客様相談室 ☎ 0570-058-669農業支援サイト <https://www.t-kouryoku.com>

住友化学アグロ事業部

