

殺菌剤

農林水産省登録
第23975号

輪斑病は見逃さぬ



耐性菌にも強い2成分混合殺菌剤

ニマイバー[®]
水和剤

ニマイバーは住友化学(株)の登録商標

茶



輪斑病



炭疽病

ニマイバー[®]

水和剤

有効成分：ジエトフェンカルブ…25.0% ペノミル…25.0%



特長

- ① 予防・治療のダブルの効果
- ② 耐性菌と感受性菌の同時防除が可能
- ③ 優れた耐雨性



適用病害の範囲及び使用方法(抜粋)

2022年4月現在の登録内容

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (ℓ/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ジエトフェンカルブを含む 農薬の総使用回数	ペノミルを含む 農薬の総使用回数
茶	炭疽病 新梢枯死症 褐色円星病	1,000	200 ～ 400	摘採 14日前 まで	1回	散布	1回	1回
	輪斑病	1,000～1,500						

※ニマイバー水和剤は、他作物にも登録があります。詳細は、ラベルでご確認ください。

輪斑病に対する効果



使用上の注意

⚠ 安全使用上の注意(抜粋)

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため本剤の過度の連用はさけ、作用性の異なる薬剤と組み合わせで輪番で使用してください。
- 本剤はエトフェンプロックス乳剤またはダイアジノン乳剤と混用した場合、凝固物を生成するため混用をさけてください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさけてください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の

責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産物植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かない ●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

04R4D22N27Z

2022年4月作成(全農製)

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCA GROUP

住友化学

〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号

お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト 農力 <https://www.i-nouryoku.com>

