

殺菌剤

農林水産省登録
第23975号

紫斑病 ダイズは見逃さぬ



新発売

耐性菌にも強い2成分混合殺菌剤

ニマイバー[®]
水和剤

ニマイバーは住友化学(株)の登録商標

豆



ダイズ紫斑病



エンドウ灰色かび病




インゲンマメ菌核病

ニマイバー[®]

水和剤

有効成分：ジエトフェンカルブ…25.0% ベノミル…25.0%



特長


- ① 予防・治療のダブルの効果
- ② 耐性菌と感受性菌の同時防除が可能
- ③ 優れた耐雨性

適用病害の範囲及び使用方法(抜粋)


2018年3月現在の登録内容

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (ℓ/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ジエトフェンカルブを 含む農薬の総使用回数	ベノミルを含む農薬 の総使用回数
豆類 種実、ただし、だいす、らっかせいを除く	灰色かび病 菌核病 炭疽病	1,000	100 ～ 300	収穫 14日前 まで	4回以内	散布	4回以内	5回以内 (種子粉衣は1回以内、 は種後は4回以内)
	紫斑病						4回以内 (種子粉衣は1回以内)	

ダイズ紫斑病に対する効果



インゲンマメ灰色かび病に対する効果



使用上の注意

△ 安全使用上の注意(抜粋)

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、作用性の異なる薬剤と組み合わせて輪番で使用してください。
- 本剤はエトフェンプロックス乳剤またはダイアジノン乳剤と混用した場合、凝固物を生成するため混用をさせてください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさせてください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の

- 使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かない。 ●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

30H3C18N28:Z

責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体质の人は取扱いに十分注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産物植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

2018年3月作成(全農教)

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCA GROUP

住友化学

T104-8260 東京都中央区新川12丁目27番1号

お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト [i-農力](https://www.i-nouryoku.com) <https://www.i-nouryoku.com>

