野菜の大型チョウ目害虫防除に

ハクサップ®

水和剤

優れた防除効果 | 優れた殺虫力と速効性 | 優れた残効性

パッケージが新しくなりました！

ハクサップは住友化学（株）の登録商標

ハクサップ®水和剤

合成ピレスロイド

医薬用外劇物

野菜の大型チョウ目害虫防除に

特 長

1 野菜の大型チョウ目害虫に優れた防除効果

あぶらな科野菜、レタス、なす等の重要害虫(チョウ目、アブラムシ類)、特に野菜に大きな被害を与えるアオムシ、ヨトウムシ類、オオタバコガ等の大型チョウ目害虫に優れた効果を発揮します。

2 優れた殺虫力と速効性

チョウ目の老齢幼虫等、薬剤に強い害虫にも高い効果を発揮します。

3 優れた残効性

優れた残効性により、少ない散布回数ですむため、省力化が期待できます。

適用作物・害虫と使用方法

農林水産省登録 第15463号 [有効成分] フェンバレレート‥10.0% マラソン‥30.0%

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量(ℓ/10a)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェンバレレートを含む農薬の総使用回数	マラソンを含む農薬の総使用回数
かんしょ	ナカジロシタバ、イモコガ エビガラスズメ、ハスモンヨトウ	1,000	100～300	収穫7日前まで	5回以内	散布	5回以内	5回以内
さといも	ハスモンヨトウ	2,000		収穫3日前まで				
なす	オンシツコナジラミ アブラムシ類、オオタバコガ			収穫前日まで				6回以内
キャベツ	アオムシ、コナガ アブラムシ類、ヨトウムシ タマナギンウワバ、ハスモンヨトウ	1,000～2,000						5回以内
	オオタバコガ	1,000						
ブロッコリー	アオムシ	2,000		収穫30日前まで	3回以内		3回以内	
はくさい	アオムシ、コナガ アブラムシ類、ヨトウムシ タマナギンウワバ、カブラハバチ	1,000～2,000		収穫前日まで	5回以内		5回以内	
	ハスモンヨトウ、オオタバコガ	1,000						
だいこん	アオムシ、コナガ アブラムシ類、ヨトウムシ ハスモンヨトウ、カブラハバチ	1,000～2,000		収穫35日前まで	3回以内		3回以内	6回以内
レタス	アブラムシ類			収穫3日前まで	2回以内		2回以内	5回以内
	オオタバコガ	1,000						
リーフレタス	アブラムシ類	1,000～2,000		収穫14日前まで				2回以内
	オオタバコガ	1,000						

2020年10月現在の登録内容

上手な使い方

害虫の発生初期に散布します

優れた殺虫力、残効性により、発生初期の散布で長期間害虫の発生を抑えます。

数種の害虫の同時防除をねらいます

広い殺虫スペクトラムと害虫の生育ステージを選ばない強い殺虫力が、併発する害虫を同時に防除します。

他剤との体系で使用してください

できるだけ連用はさけ、他剤との体系で使用してください。まず、残効性に優れるハクサップで害虫の発生初期をねらい、その後は慣行薬剤とローテーション散布を行います。慣行薬剤で防除しきれなかった老齢幼虫にも高い効果を発揮します。

使用上の注意事項(抜粋)

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 石灰硫黄合剤、ボルドー液等アルカリ性薬剤との混用はさけてください。
- 幼苗期に使用すると、展開葉に黄化などの薬害を生ずることがあるので、この時期のなすへの使用は避け、また、キャベツ、はくさい、だいこん、レタス、リーフレタスに使用する場合は所定範囲内の低濃度で散布してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。
  眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- のど、鼻、皮膚などを刺激する場合、また、かゆみを生じる場合があるので注意してください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。
  作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
  ①ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
  ②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
  ③関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。

- 蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着するおそれのある場所では使用しないでください。

- 水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 小児の手の届く所には置かないでください。● 空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

02R10J20H27:J2

2020年10月作成(ジェイツ・コンプレックス)

大地のめぐみ、まっすぐ人へ SCC GROUP

住友化学

〒104-8260 東京都中央区新川2丁目27番1号
お客様相談室 0570-058-669
農業支援サイト i-農力 https://www.i-nouryoku.com