

ビームダントツTMH[®]

粉剤DL

殺虫成分
クロチアニジン
増量!!



斑点米を
防ぎます

葉いもち



穂いもち



いもち病に優れた効果
カメムシ類に的確な効き目

セジロウンカ



ホソハリカメムシ




アカヒゲホソミドリカスミカメ



アカスジカスミカメ



ツマグロヨコバイ



トゲシラホシカメムシ



クモヘリカメムシ



ミナミアオカメムシ



ウンカ類、
ツマグロヨコバイにも
効く!!

ビームダントツHTM 粉剤DL

特 長

- ① クロチアニジン高含量製剤により水稻主要害虫に優れた効果**
散布回数の低減や、各種害虫に対してより高いレベルの防除効果が期待できます。
- ② 主要なカメムシ類に対して優れた効果**
斑点米の原因となるアカヒゲホソミドリカスミカメ、トゲシラホシカメムシ、クモヘリカメムシなどに優れた効果と残効性を発揮します。
- ③ いもち病に優れた効果**
いもち病に対する予防効果に優れ、また残効性、耐雨性にも優れています。

適用と使用方法

2019年10月現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	トリシクラゾールを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 カメムシ類、ウンカ類 ツマグロヨコバイ、ニカメイチュウ フタオビコヤガ、イネツトムシ	3~4kg / 10a	収 穫 7日前まで	2回以内	散 布	4回以内 直播では種時又は 移植時までの処理は1回以内、 本田での散布、空中散布、 無人ヘリ散布は合計3回以内	4回以内 (育苗箱への処理は 1回以内、 本田では3回以内)

上手な
使い方

穂ばらみ期

散 布

出穂期


穂揃期～乳熟期

※いもち病の防除適期に合わせた散布でもカメムシ類の防除が可能

ビームダントツH粉剤DLの残効

収 穫

防 除 効 果



⚠ 使用上の注意

- いもち病発生に際しては予防的に散布した方がより効果的です。
- 葉いもちに対しては発生が予想される場合、又は初発生をみたら直ちに散布してください。
- 穂いもちに対しては穂ばらみ後期の頃に散布してください。尚、多発生が予想される場合にはさらに出穂後に散布することが望ましい。
- 野菜類の幼苗及びなし(二十世紀、幸水、新水等)には葉害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- 本剤はできるだけ飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ、見かけ比重がやや大きく、流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しほって散布してください。
- 蚕に対して影響があるので、桑に付着するおそれがある地域では使用しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
 - マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意して下さい。
 - 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
 - 眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
 - 散布の際は農業用マスクなどを着用してください。作業後はうがいをしてください。
 - 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
 - 散布後は水管理に注意してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

2019年10月作成(全新企画社)

01R10J19B39:ZS

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCC GROUP

住友化学



動画
チャンネルは
こちら!

〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号
お客様相談室 0570-058-669
農業支援サイト 農薬力 <https://www.k-nouryoku.com>
住友化学アグロ事業部

