

ブラシんキラップ®

粉剤DL

エチプロール・フェリムゾン・フサライド水和剤

アメダスの恋人



殺虫殺菌剤

カメムシ類
に卓効!

いもち病
ごま葉枯病
穂枯れにも!



アカヒゲホソミドリカスミカメ



ミナミアオカメムシ



トゲシラホシカメムシ



ホソハリカメムシ



クモヘリカメムシ



アカスジカスミカメ



葉いもち



ごま葉枯病




穂いもち

ブラシんキラップ[®] 粉剤DL

ブラシんは住友化学(株)の登録商標、キラップはバイエルグループの登録商標

「ブラシんキラップ粉剤DL」は、斑点米カメムシに高い防除効果を示す殺虫剤「キラップ」といもち病、ごま葉枯病、穂枯れなど米の品質を低下させる病害に幅広く作用する「ブラシん」を合理的に配合した殺虫・殺菌剤です。

上手な使い方







2022年6月現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 ごま葉枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) カメムシ類 ウンカ類	3~4kg /10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布

エチプロールを含む農薬の総使用回数
2回以内 (は種時(直播)又は移植時までの処理は1回以内)
フェリムゾンを含む農薬の総使用回数
2回以内
フサライドを含む農薬の総使用回数
3回以内

防除効果



⚠ 使用上の注意<抜粋>

- たびこ、けいとう及び幼植物のだいず・あすき・いんげんまめには薬害を生ずる恐れがあるので、かからないように注意して散布してください。
- 蚕に対して影響があるので、桑に付着する恐れがある地域では使用しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ① ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - ② 関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- 作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするともに衣服を交換してください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないでください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布後は水管理に注意してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。● ラベルの記載以外には使用しないでください。● 小児の手の届く所には置かないでください。● 空袋・空容器は園場等に放置せず適切に処理してください。

04R6F22B55:ZS

2022年6月作成(全新企画社)

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCA GROUP

住友化学

〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号

お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト 農力 <https://www.i-nouryoku.com>

