

雨にも
ケロッと!

かきの炭疽病防除には

ベンレート[®]

殺菌剤

水和剤



ベンレートは住友化学(株)の登録商標です。

炭疽病防除につかえる。
収穫前日までつかえる。




炭疽病






防除効果

炭疽病



品 種：富有(40年生) 調査日：9月26日(1回目散布23日後)
 区 制：1区1樹 3反復 10月17日(2回目散布21日後)
 発生状況：中発生 調査方法：1樹50果の発病を程度別に調査し、発病果率および発病度を算出
 散布日：9月3日、26日
 ※グラフは10月17日調査結果

すす点病



品 種：会津身不知(26年生) 調査日：10月4日
 区 制：1区2主枝 3反復 調査方法：1区100果程度の発病を程度別に調査し、発病果率および発病度を算出
 散布日：7月3日、24日 9月4日

2017年12月現在の登録内容

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ペノミルを含む農薬の総使用回数
かき	落葉病、うどんこ病 炭疽病、すす点病	2000~3000倍	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	6回以内	散布	6回以内
	疑似炭疽病	2000倍					

●かき以外の水稲・野菜・果樹・花等にも登録があります。

適用病害と使用方法

⚠️<使用上の注意事項> 詳細はラベルをご参照ください。

- ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- ・本剤及び同系統の薬剤の連続使用によって薬剤耐性菌が出現し、効果の劣った例があるので過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる薬剤を組み合わせで使用してください。
- ・適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- ・本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- ・本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすしてください。
- ・使用の際は農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して

- ・ください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- ・作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- ・かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- ・水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- ・施設内に水産動植物を飼っている水槽等を置かないでください。
- ・使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器・空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- ・直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は農場等に放置せず適切に処理してください。

29H12L17B112:OG

2017年12月作成(小城プロデュース)

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCC GROUP



住友化学

〒104-8260 東京都中央区新川2丁目27番1号

お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト 農力 <https://www.i-nouryoku.com>

