

たまねぎの乾腐病・灰色腐敗病防除には

ベンレート® 殺菌剤 水和剤

ベンレートは住友化学(株)の登録商標です。



乾腐病



提供:佐賀県上場営農センター

乾腐病



提供:佐賀県上場営農センター

灰色腐敗病



児玉原図

※1 ペーパーポットにも使用できます。

乾腐病の防除に
セルトレイ灌注でつかえる。○



※2 詳しい使用方法については裏面の適用表をご確認ください



乾腐病に灌注で使えます

定植前の育苗箱トレイ灌注処理で

乾腐病を防除します。



色々な処理が可能

乾腐病には定植前の灌注、定植直前の苗浸漬、

は種前の培土混和で防除が可能です。



使いやすい使用時期

灰色腐敗病・灰色かび病・黒かび病には

散布で収穫前日まで使用できます。


適用病害と
使用方法



防除効果

乾腐病

佐賀県農業試験研究センター(平成24年)




品 種：ターザン
耕種概要：定植12月14日
発生状況：中発生(接種)
区制・反復：1区 30株 3反復
処 理 日：12月14日

処理方法：500ml/トレイ灌注
調 査 日：翌年6月24日、7月22日、8月19日
調査方法：翌年5月30日に収穫し、8月19日まで
コンテナに入れて雨除け施設で貯蔵
して発病球数を数え、発病球率を算出。

灰色腐敗病

(社)北海道植物防疫協会(平成21年)



品 種：オホーツク222
耕種概要：移植5月17日
発生状況：中発生(接種)
区制・反復：1区 6.0㎡ 3反復
散 布 日：8月15日、22日、29日

散布量：150g/10a(最着剤グラミンS5000倍を加用)
調 査 日：翌年3月18日
調査方法：9月6日に収穫し、風乾後各区83~99球
をタマネギネットに入れ、農家慣行により
貯蔵。全球を縦断して発病状況を調査。

2019年4月現在の登録内容

作物名	適用病害名	希釈倍数 または使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ベノミルを含む 農薬の総使用回数
たまねぎ	灰色腐敗病	2000~3000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	6回以内	散布	8回以内 (種子粉衣は1回、 育苗培土混和、 灌注または 苗根部浸漬は 合計1回、 散布は6回以内)
	灰色かび病 黒かび病	2000倍					
	乾腐病	50倍	セル成型育苗トレイ1箱または ペーパーポット1冊(30×60cm、 使用土壌約5ℓ)当り500ml~1ℓ	定植前	1回	灌注	
		100倍	セル成型育苗トレイ1箱または ペーパーポット1冊(30×60cm、 使用土壌約5ℓ)当り500ml				
		1g/1kg培土 20倍	—				

●たまねぎ以外の水稻・野菜・果樹・花等にも登録があります。

⚠️<使用上の注意事項> 詳細はラベルをご参照ください。

- ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- ・本剤及び同系統の薬剤の連続使用によって薬剤耐性菌が出現し、効果の劣った例があるので過度の連用を避け、なるべく作用性の異なる薬剤を組み合わせ使用してください。
- ・適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、普及指導センター、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- ・たまねぎに対して苗根部浸漬処理する場合は、誤って高濃度で処理すると、初期生育遅延等の薬害のおそれがあるので、使用方法を厳守してください。
- ・本剤はダイアジノン乳剤と混用した場合、凝固物を生成するため混用をさけてください。
- ・本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- ・本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。

付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。

- ・使用の際には農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするともに衣服を交換してください。
- ・作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- ・かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- ・水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。施設内に水産動植物を飼っている水槽等を置かないでください。
- ・使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋・空容器は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- ・直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は農場等に放置せず適切に処理してください。

31H4D19B113:OG

2019年4月作成(小城プロデュース)

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCC GROUP



住友化学

〒104-8260 東京都中央区新川2丁目27番1号

お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト 農力 <https://www.i-nouryoku.com>

