

軟腐病防除に
新しい風

細菌性病害防除に

マテリーナ水和剤



はくさい軟腐病



たまねぎ軟腐病



こんにゃく腐敗病

たまねぎ・はくさい・ばれいしょ

の軟腐病を防ぐ

細菌性病害防除に

マテリーナ水和剤

有効成分：オキシリニック酸・10.0%、ストレプトマイシン硫酸塩・12.5%（ストレプトマイシンとして10.0%） 包装：500g/袋

特長

- **軟腐病を防ぐ** オキシリニック酸とストレプトマイシン、2種類の有効成分により難防除病害といわれる軟腐病を効果的に防除します。
- **予防効果と治療効果** 2種の有効成分により、予防効果と治療効果を発揮します。

適用作物と使用方法

- ボルデー液及び石灰、タルク、ベントナイトなどの吸着性増量剤を含有する薬剤との混用はさけてください。
- はくさいに使用する場合、幼苗期、高温時には葉害（クロロシス）を生ずるおそれがあるので注意してください。
- だいこんに使用する場合、高温時には葉害（クロロシス）を生ずるおそれがあるので注意してください。

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	オキシリニック酸を含む農薬の総使用回数	ストレプトマイシンを含む農薬の総使用回数	使用方法
だいこん	軟腐病	1,000倍	収穫30日前まで	2回以内	3回以内	2回以内	散布
はくさい			収穫7日前まで	3回以内		5回以内	
たまねぎ				5回以内	5回以内	6回以内	
こんにゃく	腐敗病		収穫30日前まで	6回以内（但し植付後は5回以内）	6回以内	5回以内	
ばれいしょ	軟腐病		収穫7日前まで	3回以内	5回以内	5回以内	
ほおずき	斑点細菌病		—	4回以内	—	—	

平成17年1月現在の登録内容

上手な使い方


【予防散布が決め手です】

- **軟腐病について** 軟腐病菌は土壤中で前作の被害残渣などとともに長く残り、害虫の食痕や風雨、農作物によってできた傷口等から作物体内に侵入、伝染します。高温多湿の時に発生が著しく、茎葉部や地下部が軟化腐敗し、被害がすすむと悪臭を放ちます。

上手な使い方


（たまねぎ軟腐病）

早めの散布が防除の決め手です。




（はくさい軟腐病）

降雨前後の散布が防除の決め手です。



（ばれいしょ軟腐病）


早めに散布し進展を防ぐことが防除の決め手です。



試験成績

（たまねぎ軟腐病）

北海道立十勝農業試験場(1989)



品種：ひぐま 処理：7/10他 調査(8/14)

（はくさい軟腐病）


神奈川県園芸試験場津久井分場(1989)



品種：金将2号 処理：9/26他 調査(11/6)

（ばれいしょ軟腐病）

北海道立十勝農業試験場(1990)



品種：メークイン 処理：7/10他 調査(8/7)

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 空袋は園場等に放置せず適切に処理してください。

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCC GROUP

住友化学

住友化学株式会社

東京都中央区新川1-27-1/お客様相談室 ☎ 0120-677-088