

北海道畑作農家のたまたばこ

新登場

畑作用  
殺菌剤

# ミリオネア<sup>®</sup> フロアブル



## 北海道畑作農家のたまたてばこ

## ミリオネア®フロアブル



畑作用殺菌剤

有効成分：インピルフルキサム…37.0%

殺菌剤分類 7

ミリオネアは住友化学(株)の登録商標です

## 特長

- 1 北海道の主な畑作物(たまねぎ、まめ類※、てんさい、ばれいしょ、こむぎ)に幅広く使えます。  
※豆類(種実、ただし、らっかせいを除く)および豆類(未成熟)を指す
- 2 てんさい/根腐病・葉腐病、たまねぎ/灰色かび病(白斑葉枯病)・小菌核病・灰色腐敗病、ばれいしょ/黒あざ病、こむぎ/赤さび病等の主要病害に対し安定した防除効果を示します。

## 適用病害と使用方法

2024年9月現在

| 作物名                                   | 適用病害名                                                | 希釈倍数           | 使用液量                   | 使用時期        | 本剤の使用回数 | 使用方法             | インピルフルキサムを含む<br>農薬の総使用回数                              |           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|---------|------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 麦類<br>(小麦を除く)                         | 雪腐小粒菌核病                                              | 2000～<br>4000倍 | 60～150<br>L/10a        | 根雪前         | 2回以内    |                  | 4回以内<br>(根雪前は2回以内、<br>根雪後は2回以内)                       |           |
|                                       | うどんこ病                                                | 4000倍          |                        | 収穫7日前<br>まで |         |                  |                                                       |           |
|                                       | 赤さび病                                                 | 4000～<br>8000倍 |                        |             |         |                  |                                                       |           |
| 小麦                                    | 雪腐大粒菌核病、雪腐小粒菌核病                                      | 2000～<br>4000倍 |                        | 根雪前         |         |                  | 5回以内<br>(種子への処理は1回以内、<br>根雪前の散布は2回以内、<br>根雪後の散布は2回以内) |           |
|                                       | うどんこ病、ふ枯病                                            | 4000倍          |                        | 収穫7日前<br>まで |         |                  |                                                       |           |
|                                       | 赤さび病                                                 | 4000～<br>8000倍 |                        |             |         |                  |                                                       |           |
| 豆類<br>(種実、ただし、あずき、<br>そらまめ、らっかせいを除く)  | 菌核病、灰色かび病                                            | 4000倍          | 100～300<br>L/10a       | 収穫前日<br>まで  | 4回以内    | 散布               | 4回以内                                                  |           |
| あずき、そらまめ                              | 菌核病、灰色かび病、さび病                                        |                |                        |             |         |                  |                                                       |           |
| 豆類<br>(未成熟、ただし、さやえんどう、<br>未成熟そらまめを除く) | 菌核病、灰色かび病                                            |                |                        |             |         |                  |                                                       |           |
| 未成熟そらまめ                               | 菌核病、灰色かび病、さび病                                        |                |                        |             |         |                  |                                                       |           |
| さやえんどう                                | 菌核病、灰色かび病、さび病、うどんこ病                                  |                |                        |             |         |                  |                                                       |           |
| ばれいしょ                                 | 黒あざ病                                                 | 400～<br>1000倍  | －                      | 植付前         | 1回      | 種いも瞬間浸漬          | 4回以内<br>(種いもへの処理は1回以内、<br>植付後は3回以内)                   |           |
|                                       |                                                      | 400倍           |                        |             |         | 種いも100kg 当り3L    |                                                       | 10分間種いも浸漬 |
|                                       |                                                      | 40倍            |                        |             |         | 種いも100kg 当り300mL |                                                       | 種いも散布     |
|                                       | 夏疫病                                                  | 4000倍          | 100～300L/10a           | 収穫前日まで      | 3回以内    | 散布               |                                                       |           |
| てんさい                                  | 根腐病                                                  | 800倍           | 1L/ペーパーポット<br>1冊(3L/㎡) | 定植前         | 1回      | 灌注               | 5回以内<br>(灌注は1回以内、<br>散布は4回以内)                         |           |
|                                       |                                                      | 4000倍          | 100～300<br>L/10a       | 収穫7日前<br>まで | 4回以内    | 散布               |                                                       |           |
|                                       | 葉腐病                                                  | 4000倍          |                        |             |         |                  |                                                       |           |
| たまねぎ                                  | 灰色かび病、小菌核病                                           | 4000倍          | 100～300<br>L/10a       | 収穫前日<br>まで  | 4回以内    | 散布               | 4回以内                                                  |           |
|                                       | 灰色腐敗病                                                | 4000～<br>8000倍 |                        |             |         |                  |                                                       |           |
| ねぎ                                    | さび病                                                  | 4000～<br>8000倍 | 100～300<br>L/10a       | 収穫前日<br>まで  | 4回以内    | 散布               | 4回以内                                                  |           |
|                                       | 黒斑病、葉枯病、白絹病                                          | 4000倍          |                        |             |         | 株元散布             |                                                       |           |
|                                       | 白絹病                                                  | 4000～<br>8000倍 |                        |             |         |                  |                                                       |           |
|                                       | 黒腐菌核病                                                | 4000倍          |                        |             |         |                  |                                                       |           |
| りんご                                   | 黒星病、モニリア病、うどんこ病、褐斑病、斑点落葉病<br>黒点病、すす点病、すす斑病、赤星病、灰色かび病 | 4000倍          | 200～700<br>L/10a       | 収穫前日<br>まで  | 3回以内    | 散布               | 3回以内                                                  |           |
| ぶどう                                   | 黒とう病、褐斑病、うどんこ病、さび病                                   | 4000倍          | 200～700<br>L/10a       | 収穫前日<br>まで  | 3回以内    | 散布               | 3回以内                                                  |           |
|                                       | 灰色かび病                                                | 4000～<br>8000倍 |                        |             |         |                  |                                                       |           |

## 使用上の注意事項



- 使用前によく振ってから使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に被害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 蜜に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。かかった場合3日間は給桑しないでください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 医薬用外劇物。取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出さず、直ちに医師の

- 手当てを受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすしてください。
- 使用の際は防護マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 施設内で使用する場合、窓等を開放し十分に換気してから施設内に立ち入ってください。
- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 直射日光を避け、食品と区別して、鍵のかかるなるべく低温場所に密栓して保管してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

