

いもち病、 紋枯病、 カメムシ類

等の 同時防除に!!



- ラブサイド(いもち病)
 - バリダシン(紋枯病)
 - トレボン(カメムシ類等諸害虫)
- を配合した殺虫・殺菌混合粉剤

速く効く
長く効く
確実に効く

ST ラブバリダトレボン[®]

粉剤 DL

ST ラブ・バリダトレボン[®]

粉剤 DL

有効成分：エトフェンプロックス…0.50% バリダマイシンA…0.30% フサライド…2.5%

いもち病に予防効果と残効性を発揮する『ラブサイド』と、紋枯病にすぐれた防除効果を発揮する『バリダシン』、カメムシ類・ウンカ類に速効的に作用する『トレボン』との混合剤です。稲病害虫の同時防除剤として、高品質米の生産に貢献いたします。

特 長

- ① いもち病・紋枯病・カメムシ等の病害虫を同時防除します。
- ② 早めの防除で葉いもち、穂いもちに優れた効果を発揮します。
- ③ 紋枯病の病斑進展を強く抑制します。

■ 適用病害虫と使用方法

2012年12月現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	バリダマイシンを含む農薬の総使用回数	フサライドを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病 紋枯病 ツマグロヨコバイ ウンカ類 コブノメイガ	3～4kg /10a	収穫 14日前まで	3回以内	散布	3回以内	6回以内 (育苗箱灌注は 1回以内、 本田では5回以内)	3回以内
	カメムシ類	4kg/10a						

⚠ 使用上の注意

- きく(秀芳の力等)には薬害を生ずるおそれがあるので、かからないように注意して散布してください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し特に初めて使用する場合にはできるだけ病害虫防除等関係機関の指導を受けるようにしてください。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、近くに桑園がある場合は絶対に桑葉にかからないようにしてください。
- ミツバチの巣箱及びその周辺に飛散するおそれがある場合には使用をさけてください。
- 養蜂が行われている地区では周辺への飛散に注意する等、ミツバチへの危害防止に努めてください。
- 眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。(弱い刺激性)
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(甲殻類、冷水魚)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池等周辺での使用はさけてください。
- 散布後は水管理に注意してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋は圃場等に放置せず適切に処理してください。

24H12L12R49:ZS

2012年12月作成(全新企画社)

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCG GROUP

住友化学

住友化学株式会社

お客様相談室 0570-058-669

農業支援サイト i-農力 <http://www.i-nouryoku.com>