

総力あげて

稲を守る!!

新登場



箱将軍[®] 粒剤

水稻育苗箱用殺虫殺菌剤

適用
拡大

高密度は種に
対応



Pyraxalt[™] active

powered by
RYNAXYPYR[®]
ACTIVE INGREDIENT

ウンカ類や紋枯病をはじめとした
水稻病害虫に優れた効果



いもち病



紋枯病



トビイロウンカ



セジロウンカ



ヒメトビウンカ



コブノメイガ



箱将軍[®] 粒剤

水稻育苗箱用殺虫殺菌剤



一 水稻の主要病害虫防除が可能です。

二 ウンカ類やコブノメイガに対して優れた効果を示します。

三 いもち病・紋枯病など主要病害に優れた効果を示します。

適用病害虫および使用方法

有効成分 クロラントラニプロロール…0.75%、トリフルメゾピリム…0.75%、
イノチアニル…2.0%、フラメトビル…4.0%

殺虫剤分類 28, 4E
殺菌剤分類 P3, 7

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲 (箱育苗)	いもち病 紋枯病 穂枯れ(ごま葉枯病菌) もみ枯細菌病 内穎褐変病 白葉枯病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ イネツトムシ フタオビコヤガ コブノメイガ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り50g 高密度には種する 場合は1kg/10a [育苗箱(30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り50~100g]	移植7日前～ 移植当日	1回	育苗箱の 上から 均一に 散布する


クロラントラニプロロールを 含む農薬の総使用回数	1回	トリフルメゾピリムを 含む農薬の総使用回数	1回
イノチアニルを 含む農薬の総使用回数	3回以内 (移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)	フラメトビルを 含む農薬の総使用回数	2回以内 (移植時までの処理は1回以内)

2021年11月現在の登録内容(太字は2021年10月27日適用拡大)

試験成績


■いもち病(葉)

品 種: あきげしき
は 種 日: 5月2日 移 植 日: 6月2日
処 理 日: 6月2日(移植当日)
発生状況: 多発生(接種)
調 査 日: 7月28日(移植56日後)
8月9日(移植68日後)
調査方法:
7月28日は各処理区の接種源より5株以上離れた中央
2条の30株について、全葉の病斑数を調査し、防除値を
算出した。8月9日は上位3葉の病斑数を調査し、株当り
病斑数の平均値から防除値を算出した。(3反復)




■紋枯病

品 種: ヒノヒカリ
は 種 日: 5月30日 移 植 日: 6月20日
処 理 日: 箱将軍/6月20日(移植当日)
B剤/5月30日(は種時覆土前)
発生状況: 中発生(接種)
調 査 日: 10月3日(移植105日後)
調査方法:
10月3日に各区100株の発病株率と発病株の
病斑高率を調査し、被害度から防除値を算出
した。(3反復)




■トビウロンカ

品 種: ヒノヒカリ
は 種 日: 5月22日 移 植 日: 6月17日
処 理 日: 6月17日(移植当日)
発生状況: 中発生
調 査 日: 9月15日(移植90日後)
9月23日(移植98日後)
調査方法:
1区3ヶ所各30株について、粘着板への2回払い
落としにより、生息虫数を成虫・幼虫別に調査した。



■コブノメイガ

品 種: ヒノヒカリ
は 種 日: 5月24日 移 植 日: 6月18日
処 理 日: 6月18日(移植当日)
発生状況: 多発生
調 査 日: 8月24日(移植67日後)
9月6日(移植80日後)
調査方法:
8月24日は各区2別連続50株3ヶ所の上位
3葉の被害率を調査し、被害率を算出した。
9月6日は各区2別連続50株3ヶ所の上位1葉
の被害率を調査し、被害率を算出した。



注意事項

〈効果・薬害等の注意〉

- 育苗箱の上から均一に散布する場合、葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水して田植機にかけ
て移植してください。
- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗等には薬害を生じるおそれがあるので注意してください。
- 育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ)1箱当りに乾粉として200から300g程度を高密度には種
する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱
当りの薬量を50から100gまでの範囲で調整してください。
- 本田の整地が不均整な場合は薬害を生じやすいので、代かきではいねいに行い、移植後田面が露出
しないように注意してください。
- いぐさの栽培予定水田では使用しないでください。また、本剤を処理した稲苗を移植した水田では
いぐさを栽培しないでください。

- きく等の他作物に影響を及ぼす場合があるので、薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように散布して
ください。また、土壌全面に不透水性無孔シートを敷くなど、薬剤処理後の灌水による土壌への浸透
をさけてください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用
する場合には、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望ましい。

〈安全使用上の注意〉

- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に入らないよう水管理に注意してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物
に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●空袋・空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

03R11K21H25:ZS

2021年11月作成(全新企画社)

大地のめぐみ、まっすぐ人へ
SCA GROUP

住友化学



動画
チャンネルは
こちら！

〒103-6020 東京都中央区日本橋2丁目7番1号
お客様相談室 ☎ 0570-058-669
農業支援サイト 農薬力 <https://www.t-kouryoku.com>
住友化学アグリ事業部

