



特 長

広い殺虫スペクトラム

チョウ目害虫はもちろん、チャノキイロアザミウマ・

チャトゲコナジラミに対しても

防除効果を発揮するので、幅広い害虫の防除が可能です。

ハマキムシ類に優れた効果

各生育ステージ(卵・幼虫・成虫)に高い効果を示します。

よって、散布適期が広く使いやすい薬剤です。

摘採前日まで使用可能

生育と害虫発生パターン例

■茶のディアナSC散布時期

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月	
	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下	上	下
生育ステージ														
ディアナSCのおすすめ散布時期														
防除時期														
チャノコカクモンハマキ														
チャハマキ														
チャノホソガ														
チャノキイロアザミウマ														
チャトゲコナジラミ														

■ ディアナSCのおすすめ散布時期 ■ 防除時期

【注意】地域により害虫の発生および防除時期は異なりますので、病害虫防除所等関係機関の指導に従い使用してください。



殺虫スペクトラム

■主な茶害虫に対する殺虫活性(有効成分)

害虫名(萌芽期～開葉期)	実用性	害虫名(生育期)	実用性
チャノキイロアザミウマ	○	チャノコカクモンハマキ	○
チャノミドリヒメヨコバイ	×	チャハマキ	○
チャノホソガ	○	ヨモギエダシャク	○
コミカンアブラムシ	×	チャトゲコナジラミ	○


有効成分(スピネトラム) ○:47ppmで実用性あり ×:47ppmで実用性なし 参考:ディアナSC 2,500倍=47ppm

適用害虫および被害

■チャノコカクモンハマキ



被害



卵



幼虫



成虫

■チャハマキ



被害



幼虫

■チャノホソガ



被害



幼虫

■チャノキイロアザミウマ



被害



成虫

■ヨモギエダシャク



被害



幼虫