




チャノホソガ(圃場試験)


■防除効果①



実施年: 2006年
 試験場所: 奈良県植物防疫協会
 供試作物: 茶(品種: やぶきた)
 発生状況: 少発生
 区制・面積: 8.4㎡/区、3反復
 散布日: 7月28日(発蛾最盛日8日後)
 散布量: 200ℓ/10a
 調査日: 8月10日(散布13日後)
 調査方法: 各区内の巻葉数を調査。

対照薬剤に対して同等～優れた効果であり、実用性は高い。


■防除効果②



実施年: 2007年
 試験場所: 福岡県農業総合試験場 八女分場
 供試作物: 茶(品種: やぶきた)
 発生状況: 中発生
 区制・面積: 5.4㎡/区、3反復
 散布日: 6月19日(発蛾最盛日7日後)
 散布量: 200ℓ/10a
 調査日: 6月30日(散布11日後)
 調査方法: 各区4ヶ所の巻葉数を調査。

対照薬剤とほぼ同等の効果であり、実用性は高い。

■防除効果③



実施年: 2010年
 試験場所: 長崎県農林技術開発センター
 供試作物: 茶(品種: やぶきた)
 発生状況: 少発生
 区制・面積: 10㎡/区、3反復
 散布日: 8月12日(萌芽時)
 散布量: 200ℓ/10a
 調査日: 8月26日(散布14日後)
 調査方法: 各区内の巻葉数を調査。

対照薬剤に対して優れた効果であり、実用性は高い。