



特 長

広い殺虫スペクトラム

チョウ目害虫に対し、防除効果を発揮します。

ハマキムシ類に優れた効果

各ステージ(卵・幼虫・成虫)に高い効果を示します。
よって、散布適期が広く使いやすい薬剤です。

収穫前日まで使用可能

殺虫スペクトラム


■主な果樹害虫に対する殺虫活性(有効成分)

目	害虫名	実用性	目	害虫名	実用性
チョウ目	リンゴコカクモンハマキ	○	アザミウマ目	チャノキイロアザミウマ	○
	ミダレカクモンハマキ	○		ミカンキイロアザミウマ	○
	トビハマキ	○		カキクダアザミウマ	○
	キンモンホソガ	○	ハエ目	オウトウショウジョウバエ	○
	モモシンクイガ	○	カメムシ目	アブラムシ類	×
	ナシヒメシンクイ	○		カメムシ類	×
	モモノゴマダラノメイガ	○		ミカンキジラミ	○
	スモモヒメシンクイ	○			
	ギンモンハモグリガ	○			
	モモハモグリガ	○			
	ミカンハモグリガ	○			
	アメリカシロヒトリ	○			
	ヒメシロモンドクガ	○			
	クワゴマダラヒトリ	○			
	モンクロシャチホコ	○			
	ハスモンヨトウ	○			
	ヨモギエダシャク	○			



リンゴコカクモンハマキ(基礎活性)

■殺卵活性



実施年: 2008年

試験場所: 住友化学

供試虫ステージ: 卵(住化累代飼育系統)

試験方法: 卵浸漬試験


薬液に卵を10秒間浸漬した後、人工飼料を入れたポリカップに入れた。

(約100卵/区、6反復)

調査: 処理9日後、未孵化卵を調査し、殺卵率を算出。

卵に対し殺卵活性を示す。

■殺幼虫活性



実施年: 2010年

試験場所: 住友化学

供試作物: りんご(品種: ふじ)

供試虫ステージ: 2齢幼虫


(住化累代飼育系統)

試験方法: 5~6葉期のりんご実生苗の葉をホッチキスでとめ、葉と葉の間に供試虫を接種。1日後に薬液を散布した。(10頭/区、3反復)

調査: 処理5日後、死虫数を調査。

幼虫に対し高い殺虫活性を示す。

■殺成虫活性



実施年: 2009年

試験場所: 住友化学

供試虫: 成虫(住化累代飼育系統)

試験方法: 容器散布試験

薬液を容器の内側に散布し、直後に供試虫を入れた。

(20頭/区、3反復)

調査: 処理3日後、苦死虫数を調査。

成虫に対し高い殺虫活性を示す。