




# なし

## ナシヒメシンクイ(圃場試験)


### ■防除効果①



実施年: 2006年  
 試験場所: 三重県農業研究所  
 供試作物: なし(品種: 長十郎) 38年生  
 発生状況: 多発生  
 区制・面積: 10㎡/区、3反復  
 散布日: 8月2日、14日  
 散布量: 7ℓ/区(十分量)  
 調査日: 9月5日(最終散布22日後)  
 調査方法: 果実を収穫し被害を調査。

対照薬剤に対して優る効果で  
実用性が高い。

### ■防除効果②



実施年: 2005年  
 試験場所: 日本植物防疫協会研究所(山梨)  
 供試作物: なし(品種: 幸水) 10年生  
 発生状況: 中発生  
 区制・面積: 10~12樹/区、反復なし  
 散布日: 6月5日、16日、30日、  
 7月13日、29日、8月4日  
 散布量: 40ℓ/区  
 調査日: 8月15日(収穫期、最終散布11日後)  
 調査方法: 果実を収穫し被害を調査。

対照薬剤に対して優る効果で  
実用性が高い。





# なし

## 混用薬害事例

### ■ディアナWDG 5,000倍との混用で実施

|     | 混用薬剤名          | 希釈倍数<br>(倍) | 薬害の<br>有無 |     | 混用薬剤名        | 希釈倍数<br>(倍) | 薬害の<br>有無 |
|-----|----------------|-------------|-----------|-----|--------------|-------------|-----------|
| 殺菌剤 | ICボルドー412      | 30          | ○         | 殺菌剤 | ビスダイセン水和剤    | 500         | ○         |
|     | Zボルドー          | 500         | ○         |     | フロンサイド水和剤    | 1,000       | ○         |
|     | アミスター 10フロアブル  | 1,000       | ○         |     | フロンサイドSC     | 2,000       | ○         |
|     | アフエットフロアブル     | 2,000       | ○         |     | ペフキノン水和剤     | 1,000       | ○         |
|     | アフエットフロアブル15   | 1,500       | ○         |     | ベルクート水和剤     | 1,000       | ○         |
|     | アリエッティC水和剤     | 400         | ○         |     | ベルクートフロアブル   | 1,500       | ○         |
|     | アンビルフロアブル      | 1,000       | ○         |     | ベンレート水和剤     | 2,000       | ○         |
|     | アントラコール顆粒水和剤   | 500         | ○         |     | ポリオキシシンO水和剤  | 1,000       | ○         |
|     | インダーフロアブル      | 5,000       | ○         |     | ポリオキシシンAL水和剤 | 1,000       | ○         |
|     | オキシラン水和剤       | 500         | ○         |     | ポリキャプタン水和剤   | 1,000       | ○         |
|     | オーソサイド水和剤80    | 600         | ○         |     | ロブラール水和剤     | 1,000       | ○         |
|     | キノンドーフロアブル     | 800         | ○         |     | ロブドー水和剤      | 600         | ○         |
|     | サニパー           | 600         | ○         |     | ユニックスZ水和剤    | 500         | ○         |
|     | スカウトフロアブル      | 1,500       | ○         |     | ユニックス顆粒水和剤47 | 1,000       | ○         |
|     | スコア顆粒水和剤       | 2,000       | ○         | ダニ剤 | オサダン水和剤25    | 1,000       | ○         |
|     | ストライド顆粒水和剤     | 1,500       | ○         |     | カネマイトフロアブル   | 1,000       | ○         |
|     | スターナ水和剤        | 1,000       | ○         |     | コロマイト水和剤     | 2,000       | ○         |
|     | ストロビードライフフロアブル | 2,000       | ○         |     | スターマイトフロアブル  | 2,000       | ○         |
|     | ダイボルトフロアブル     | 500         | ○         |     | タイタロンフロアブル   | 2,000       | ○         |
|     | デランフロアブル       | 1,000       | ○         |     | ダニゲッターフロアブル  | 2,000       | ○         |
|     | トップジンM水和剤      | 1,000       | ○         |     | ダニサラバフロアブル   | 1,000       | ○         |
|     | トリフミン水和剤       | 2,000       | ○         |     | ダニトロンフロアブル   | 1,000       | ○         |
|     | ナリアWDG         | 2,000       | ○         |     | ダニメツフロアブル    | 1,000       | ○         |
|     | バイレトン水和剤5      | 500         | ○         |     | バロックフロアブル    | 2,000       | ○         |
|     | バルノックスフロアブル    | 500         | ○         |     | マイトコーネフロアブル  | 1,000       | ○         |

薬害の有無 ○:実用性に問題なし、 ×:実用性に問題あり

※この混用薬害事例は、農薬の現地混用に関する物理化学性や作物に対する薬害の試験事例を参考として紹介するもので、混用を薦めたり結果を保証するものではありません。

## 品種別薬害事例

### ■ディアナWDG 5,000倍で薬害が認められなかった品種

幸水、豊水、長十郎、二十世紀、ラ・フランス