

〔クロラントラニプロール・トリフルメゾピリム・
イソチアニル・フラメトピル粒剤〕

農林水産省登録 第24131号

性 状：類白色細粒

毒 性：普通物

危 険 物：－

有効年限：4 年

包 装：1 kg×12 袋

箱 将 軍[®] 粒 剤

有効成分：クロラントラニプロール…0.75% トリフルメゾピリム……………0.75%
イソチアニル……………2.0% フラメトピル……………4.0%



「住友化学農業ガイド」の見方：i-農力サイトの「製品情報」、「農業ガイドを見る」から、「農業ガイドの見方」をご覧ください。
本剤の最新情報：こちらのQRコードを読み取るとi-農力サイトに掲載されている本剤の最新情報をご覧いただけます。

〔適用と使用方法〕

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期*	総使用回数*	使用方法
稲 (箱育苗)	いもち病 紋枯病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) もみ枯細菌病 内穎褐変病 白葉枯病 イネミズゾウムシ イネドロオイムシ ウンカ類 ツマグロヨコバイ ニカメイチュウ イネツトムシ フタオビコヤガ コブノメイガ	育苗箱 (30×60×3 cm、 使用土壌約5 ℓ) 1箱当り 50 g	移植7日前 ～移植当日	本 剤：1回 クロラントラニプロール：1回 トリフルメゾピリム：1回 イソチアニル：3回 (#1) フラメトピル：2回 (#2)	育苗箱の上 から均一に 散布する

#1：移植時までの処理は1回、本田では2回

#2：移植時までの処理は1回



効果・葉害等の注意

- 育苗箱の上から均一に散布する場合、葉に付着した薬剤を払い落とし、軽く散水して田植機にかけて移植する。
- 軟弱徒長苗、むれ苗、移植適期を過ぎた苗等には葉害を生じるおそれがあるので注意する。
- 本田の整地が不均整な場合は葉害を生じやすいので、代かきはていねいに行い、移植後田面が露出しないように注意する。
- いぐさの栽培予定水田では使用しない。また、本剤を処理した稲苗を移植した水田ではいぐさを栽培しない。
- きく等の他作物に影響を及ぼす場合があるので、薬剤が育苗箱からこぼれ落ちないように散布する。
また、土壌全面に不透水性無孔シートを敷くなど、薬剤処理後の灌水による土壌への浸透をさける。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。



安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

(2020年9月9日現在の内容) 住友化学の農業支援サイト: i 農力 <https://www.i-nouryoku.com/>

- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意する。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
- 直射日光をさけ、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管する。

〔品目特性〕

- 一剤で水稻の主要病害虫防除が可能です。
- ウンカ類やコブノメイガに対して優れた効果を示します。
- いもち病・紋枯病など主要病害に優れた効果を示します。