

植物成長調整剤
STジベラ錠
ジベレリン水溶剤

平成24年1月25日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

作物名「不知火」「はるみ」の「ジベレリンを含む農薬の総使用回数」「1回」を「3回以内」に変更する。

作物名「温州みかん」の使用目的「花芽抑制による樹勢の維持」に使用濃度「ジベレリン 10ppm」、使用方法「立木全面散布又は枝別散布(プロヒドロジャスモン 2000 倍液に加用)」を追加する。

【変更前】

作物名	使用目的	使用濃度	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジベレリンを含む農薬の総使用回数
温州みかん	花芽抑制による樹勢の維持	ジベレリン 25～50ppm	収穫直後～収穫約 1ヶ月後	1回	立木全面散布 又は枝別散布	3回以内
	落果防止		開花始め ～満開10日後		散布	
	浮皮軽減	ジベレリン 3.3～5ppm	収穫予定日の 3ヶ月前 但し、 収穫45日前まで		果実散布 (プロヒドロジャ スモン 1000～2000 倍液に加用)	

【変更後】

作物名	使用目的	使用濃度	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジベレリンを含む農薬の総使用回数
温州みかん	花芽抑制による樹勢の維持	ジベレリン 25～50ppm	収穫直後～収穫約 1ヶ月後	1回	立木全面散布 又は枝別散布	3回以内
		ジベレリン 10ppm			立木全面散布 又は枝別散布 (プロヒドロジ ャスモン 2000 倍 液に加用)	
	落果防止	ジベレリン 25～50ppm	開花始め ～満開10日後		散布	
	浮皮軽減	ジベレリン 3.3～5ppm	収穫予定日の 3ヶ月前 但し、 収穫45日前まで		果実散布 (プロヒドロジャ スモン 1000～2000 倍液に加用)	

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社