

除草剤  
**アグロスクリンチャーEW**  
シハロホップブチル乳剤

平成28年8月3日付けで以下の適用拡大が登録されました。

## 【変更内容】

- ・適用土壌及び適用地帯の項目削除
- ・移植水稻の適用雑草名の変更
  - (ア) キュウスノメノヒ(関東以西)→キュウスノメノヒ
  - (イ) アゼガヤ(近畿・中国・四国・九州)→アゼガヤ

## 【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	シハロホップブチルを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
移植水稻	ノヒ キュウスノメノヒ アゼガヤ	移植後20日 ～ノヒ6葉期 但し、収穫30 日前まで	100mL /10a	25～ 100L /10a	2回 以内	湛水散布又 は落水散布	3回 以内
直播水稻	水田一年生 イネ科雑草	は種後10日 ～ノヒ5葉期 但し、収穫30 日前まで				雑草茎葉 散布	

作物名	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	シハロホップブチルを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	ノヒ	は種後10日 ～ノヒ5葉期	1000 倍	育苗箱 (30×60cm) 当り18mL	1回	雑草茎葉 散布	3回 以内

次頁へ続く

前頁より続く

#### 使用上の注意事項の変更

(変更前)

- ・本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けること。

(変更後)

- ・本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用すること。特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社