

## 除草剤

## アグロスクリンチャージャンボ

## シハロホップブチル粒剤

平成30年6月27日付けで以下の適用拡大が登録されました。

## 【変更内容】

- ・作物名「移植水稻」の適用雑草名に「キシュウスズメノヒエ」、「アゼガヤ」を追加する。
- ・作物名「移植水稻」の使用量「小包装（パック）20個（1kg）/10a」の使用時期を「移植後15日～ノビエ3葉期 但し、収穫40日前まで」から「移植後7日～ノビエ4葉期 但し、収穫30日前まで」に変更する。
- ・作物名「移植水稻」の使用量「小包装（パック）30個（1.5kg）/10a」の使用時期を「移植後25日～ノビエ4葉期 但し、収穫40日前まで」から「移植後25日～ノビエ5葉期 但し、収穫30日前まで」に変更する。
- ・適用土壌及び適用地帯を削除する。
- ・作物名に「直播水稻」を追加する。

## 【変更後】

| 作物名  | 適用雑草名               | 使用時期                         | 使用量                        | 本剤の使用回数 | 使用方法                 | シハロホップブチルを含む農薬の総使用回数 |
|------|---------------------|------------------------------|----------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 移植水稻 | ノビエ、キシュウスズメノヒエ、アゼガヤ | 移植後7日～ノビエ4葉期<br>但し、収穫30日前まで  | 小包装（パック）<br>20個（1kg）/10a   | 2回以内    | 水田に小包装（パック）のまま投げ入れる。 | 3回以内                 |
|      |                     | 移植後25日～ノビエ5葉期<br>但し、収穫30日前まで | 小包装（パック）<br>30個（1.5kg）/10a |         |                      |                      |
| 直播水稻 | ノビエ                 | は種後10日～ノビエ3葉期<br>但し、収穫30日前まで | 小包装（パック）<br>20個（1kg）/10a   |         |                      |                      |
|      |                     | は種後25日～ノビエ4葉期<br>但し、収穫30日前まで | 小包装（パック）<br>30個（1.5kg）/10a |         |                      |                      |

## 使用上の注意事項の変更

- ・「本剤は水溶性フィルムで小包装した製剤をそのまま、10アール当たり20個（移植水稻でノビエ4葉期まで、直播水稻でノビエ3葉期まで）又は30個（移植水稻ではノビエ5葉期まで、直播水稻ではノビエ4葉期まで）の割合で水田に均一に投げ入れること。」に変更する。
- ・「キシュウスズメノヒエ防除は展開葉が水面に接する条件で使用する。」を追加する。
- ・「アゼガヤには、草丈20cmまで有効なので時期を失ないように散布すること。」を追加する。

次頁へ続く

前頁より続く

- ・「藻類または表層剥離の発生しやすい水田では、有効な剤との組み合わせで使用する。」に変更する。
- ・「砂質土壌の水田及び漏水田（減水深 2cm/日以上）では使用をさける。」に変更する。
- ・「本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用すること。特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受ける。」に変更する。

使用上の注意事項などについては、製品に添付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社