

除草剤  
住化バサグラン液剤(ナトリウム塩)  
ベンタゾン液剤

令和3年1月13日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「たまねぎ(春播移植栽培)、たまねぎ(秋播移植栽培)、らっきょう、いんげんまめ、えんどうまめ、実えんどう、さやえんどう、とうもろこし、飼料用とうもろこし、ソルガム、麦類(小麦を除く)、小麦、はとむぎ、せり」の使用方法を「雑草茎葉散布又は全面散布」に変更する。
- ・適用地帯の欄を削除する。
- ・作物名「たまねぎ(春播移植栽培)」及び「たまねぎ(秋播移植栽培)」を「たまねぎ」に変更し、「たまねぎ」の使用時期を「春播栽培の移植後6月上旬まで(雑草の3~4葉期)但し 収穫30日前まで」及び「秋播栽培の移植後生葉4葉期まで(雑草の3~4葉期)但し 収穫30日前まで」とする。
- ・作物名「移植水稻」及び「直播水稻」の適用雑草名「水田一年生雑草(イネ科を除く)」を「一年生雑草(イネ科を除く)」に変更する。

前頁より続く

## 【変更後】

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用 方法	ベンザン を含む 農薬の総 使用回数				
			薬量	希釈水量							
たまねぎ	一年生 雑草 (イネ科 を除く)	春播栽培の移植後6月上旬ま で(雑草の3~4葉期) 但し 収穫30日前まで、	60~120 mL/10a	70~100 L/10a	1回	雑草茎 葉散布 又は 全面散 布	1回				
		秋播栽培の移植後生葉4葉期 まで(雑草の3~4葉期) 但し 収穫30日前まで									
らっきょう		出芽後 (雑草の3~6葉期) 但し 収穫60日前まで	100~200 mL/10a								
いんげんまめ		初生葉展開期~ 本葉抽出始期 (雑草の2~3葉期)	50~70 mL/10a								
えんどうまめ		3~6葉期 (雑草の3~6葉期) 但し 収穫70日前まで	100~200 mL/10a								
実えんどう さやえんどう		3~6葉期 (雑草の3~6葉期) 但し 収穫40日前まで	100~150 mL/10a								
とうもろこし 飼料用とうもろこし		生育期 (雑草の3~6葉期) 但し 収穫50日前まで	100~150 mL/10a								
ソルガム		生育期 (雑草の3~6葉期) 但し 収穫 30 日前まで	100~200 mL/10a								
麦類 (小麦を除く)		生育期 (雑草の3~6葉期) 但し 収穫90日前まで	100~200 mL/10a								
小麦		生育期 (雑草の3~6葉期) 但し 収穫45日前まで	150 mL/10a								
はとむぎ		親株養成期 植付45~60日後まで	200 mL/10a					100 L/10a	2回 以内	1回	2回以内
せり		生育期 (雑草の生育初期~6葉期) 但し 収穫45日前まで	100~200 mL/10a					70~100 L/10a	1回	畦間雑 草茎葉 散布	1回

次頁へ続く

前頁より続く

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用 方法	ベンザン を含む 農薬の総 使用回数
			薬量	希釈水 量			
移植水稻	一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ オモダカ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ コウキヤガラ エゾノサヤヌカグサ シズイ クサネム	移植後15～55日 但し 収穫50日前まで	500～700 mL/10a	70～ 100 L/10a	2回 以内	落水 散布 又は ごく 浅く 湛水 して 散布	2回以内
直播水稻	一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ オモダカ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ	は種後35～50日 但し 収穫50日前まで					

## 使用上の注意事項の変更

## 【追加】

- ・ 雑草茎葉にかかるように散布すること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社