

殺虫剤
ダントツ粒剤
クロチアニジン粒剤

令和3年2月10日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「あずき」を追加する。
- ・作物名「えだまめ」を追加する。
- ・作物名「レタス」に使用方法「植穴処理土壌混和」を追加する。
- ・作物名「レタス」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「3回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内）」を「5回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内）」に変更する。
- ・作物名「非結球レタス」に使用方法「セル成型育苗トレイまたはペーパーポットの上から散布する」を追加する。
- ・作物名「非結球レタス」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「3回以内（育苗期の株元処理は1回以内、散布は2回以内）」を「5回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内）」に変更する。
- ・作物名「みずな」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「3回以内」を「4回以内（は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内）」に変更する。
- ・作物名「はくさい」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「3回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内）」を「5回以内（定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内）」に変更する。

次頁へ続く

前頁より続く

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｸﾞﾗﾌﾞﾝを含む農薬の総使用回数	
あずき	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ類	6kg/10a	は種時	1回	播溝処理 土壌混和	4回以内 (は種時の処理は1回以内、 は種後は3回以内)	
えだまめ			定植時		植穴処理 土壌混和		
いん		2g/株	育苗期 後半		切成型育苗トレイ 1箱または ﾊﾟｰﾊﾟｰﾎｯﾄ1冊 (30×60cm、 使用土壌 約1.5～4L) 当り50g	株元処理	5回以内 (定植時までの処理は 1回以内、 定植後の散布は 2回以内、 定植後の株元散布は 2回以内)
		0.5g/株				切成型育苗トレイ または ﾊﾟｰﾊﾟｰﾎｯﾄの 上から 散布する	
非結球いん		0.5g/株			株元処理		
みずな		6kg/10a			は種時	播溝処理 土壌混和	
はくさい	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ類 ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ	0.25g/株	は種時	覆土後 切成型育苗トレイ または ﾊﾟｰﾊﾟｰﾎｯﾄの 上から散布する	5回以内 (定植時までの処理は 1回以内、 定植後の散布は 2回以内、 定植後の株元散布は 2回以内)		
	ｺｶﾞ ｱｵﾐ ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ類 ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ ｷﾘﾐﾝ類	0.5g/株	育苗期 後半	株元処理			
	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ類 ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ	1～2g/株	定植時	植穴処理 土壌混和			
	ｺｶﾞ ｱｵﾐ	2g/株					

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社