

殺虫剤  
ダントツ粒剤  
クロチアニジン粒剤

令和3年3月10日付けで以下の適用拡大が登録されました。

## 【変更内容】

- ・作物名「樹木類（げっきつを除く）」を追加する。
- ・作物名「さとうきび」の使用法「株元散布」に適用病害虫名「カンシャワタアブラムシ」および「メイチュウ類」を追加する。
- ・作物名「ねぎ」の使用法「株元散布」に適用病害虫名「ネダニ類」、使用量「6kg/10a」を追加する。
- ・作物名「げっきつ」に適用病害虫名「コガネムシ類」を追加する。

## 【変更部分】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数
樹木類 (げっきつを除く)	コガネムシ類	6~9kg/10a	生育期	5回以内	株元散布	6回以内
さとうきび	ハリガネムシ類	4~6kg/10a	植付時	1回	植溝処理 土壌混和	7回以内 (植付時までの処理は1回以内、 植付後の粒剤の処理は3回以内、 水和剤の処理は3回以内)
	メイチュウ類 アトコガネ	6~9kg/10a				
	カンジャコバネガカムシ シロスジオザムシ		培土時	3回以内	株元処理 土壌混和	
	カンジャコバネガカムシ カンシャワタアブラムシ メイチュウ類		収穫30日前まで		株元散布	
ねぎ	ネダニ ネダニ	6kg/10a	は種時	1回	作条処理 土壌混和	4回以内 (定植時までの処理は1回以内)
	ネダニ ネダニ タネバエ		植付時		植溝処理 土壌混和	
	ネダニ ネダニ	3~6kg/10a	収穫3日前まで	4回以内	株元散布	
	ネダニ類	6kg/10a				
げっきつ	シロコシジミ	30~40g/株	発生初期	6回以内	生育期 株元散布	6回以内
	コガネムシ類	6~9kg/10a	生育期	5回以内	株元散布	

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社