

殺虫剤
住化スミチオン乳剤
MEP乳剤

令和3年4月7日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「さくら」を追加する。
- ・作物名「ほうれんそう」の適用病害虫名「ホウレンソウケナガコナダニ」の希釈倍数「2000倍」を「1000～2000倍」に変更する。
- ・作物名「もも」および「うめ」の希釈倍数「1000倍」に適用病害虫名「クビアカツヤカミキリ」を追加する。
- ・作物名「さかき」に適用病害虫名「サカキブチヒメヨコバイ」を追加する。

前頁より続く

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	MEPを含む農薬の総使用回数
さくら	クビアカツカミキリ	1000倍	200~700 L/10a	成虫発生初期	6回以内	散布	6回以内
ほうれんそう	アブラムシ類 ホリソウカガコダマニ	1000~2000倍	100~300 L/10a	収穫21日前まで	2回以内		2回以内
もも	アブラムシ類 モモハゲリガ ナヒダシクイ(心折防止)	1000~2000倍	200~700 L/10a	収穫3日前まで	6回以内		6回以内 (樹幹処理は1回以内)
	ナヒダシクイ モシクイガ ハマキムシ類 クワシカカラムシ カメムシ類	1000倍					
	クビアカツカミキリ	1500倍		成虫発生初期 但し、 収穫3日前まで			
	クワシカカラムシ			収穫3日前まで			
うめ	アブラムシ類	1000~2000倍	1000倍	収穫14日前まで	2回以内		
	アメリカシロヒトリ ハマキムシ類	クビアカツカミキリ		成虫発生初期 但し、 収穫14日前まで			
	クビアカツカミキリ			6回以内	6回以内		
さかき	ハマキムシ類 サキブチヒメコバエ	1000倍	-	6回以内	6回以内		

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社