

殺虫殺菌剤  
**スタウトダントツ箱粒剤08**  
クロチアニジン・イソチアニル粒剤

令和3年5月26日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「稲（箱育苗）」に適用病害虫名「イネクロカメムシ」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	イソチアニルを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 穂枯れ (ごま葉枯病菌) 内穎褐変病 イネズグムシ イネトコブムシ ウカ類 ツマゲロコバイ イネヒメハダカ イネカメムシ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	は種前	1回	育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。	4回以内 (移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)	3回以内 (移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)
			は種時(覆土前)～移植当日		育苗箱の上から均一に散布する。		
			移植当日		育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。		
	は種前		育苗箱の上から均一に散布する。				
	苗立枯細菌病 苗腐敗症 (もみ枯細菌病菌)		は種時(覆土前)				

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社