

殺菌剤  
ベンレート水和剤  
ベノミル水和剤

令和3年7月21日付けで以下の適用拡大が登録されました。

## 【変更内容】

- ・作物名「かぼちゃ」および「ズッキーニ」を追加する。
- ・作物名「小麦」の使用時期「収穫7日前まで」に適用病害虫名「うどんこ病」、希釈倍数「2000倍」を追加する。
- ・作物名「かんしょ」に適用病害虫名「斑点病」、使用方法「散布」を追加し、ベノミルを含む農薬の総使用回数「1回」を「4回以内（植付時までの処理は1回以内、植付後は3回以内）」に変更する。
- ・作物名「なす」の希釈倍数「2000倍」に適用病害虫名「フザリウム立枯病」を追加する。
- ・作物名「みかん」および「かんきつ（みかんを除く）」に適用病害虫名「貯蔵病害（白かび病）」、希釈倍数「4000倍」を追加する。
- ・作物名「しゃくやく（薬用）」に適用病害虫名「根黒斑病」、使用方法「10分間苗基部浸漬」および「16時間苗基部浸漬」を追加し、ベノミルを含む農薬の総使用回数「8回以内」を「9回以内（植付前までの処理は1回以内、植付後は8回以内）」に変更する。
- ・作物名「豆類（種実）」を「野菜類」に統合し、削除する。

## 【変更部分】

| 作物名   | 適用病害虫名 | 希釈倍数<br>または<br>使用量 | 使用液量             | 使用時期        | 本剤の<br>使用<br>回数 | 使用方法 | ベノミル<br>を含む<br>農薬の<br>総使用回数                    |
|-------|--------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|------|--|
| かぼちゃ  | 白斑病    | 2000~3000倍         | 100~300<br>L/10a | 収穫前日まで      | 3回<br>以内        | 散布   | 4回以内<br>(種子粉衣は<br>1回以内、<br>は種後は<br>3回以内)       |
| ズッキーニ | 菌核病    | 3000倍              |                  |             |                 |      |  |
| 小麦    | 雪腐病    | 2000~3000倍         | 60~150<br>L/10a  | 根雪前         | 1回              | 散布   | 4回以内<br>(種子への<br>処理は<br>1回以内、<br>は種後は<br>3回以内) |
|       | 赤かび病   |                    |                  | 収穫7日前<br>まで | 2回<br>以内        |      |  |
|       | うどんこ病  | 2000倍              |                  |             |                 |      |  |

次頁へ続く

前頁より続く

| 作物名                  | 適用病害虫名                              | 希釈倍数<br>または<br>使用量 | 使用液量             | 使用時期                   | 本剤<br>の<br>使用<br>回数 | 使用方法                      | ペ/ミル<br>を含む<br>農業の<br>総使用回数                         |                |           |       |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|---|----------------|-----------|-------|
| かんしょ                 | つる割病<br>黒斑病                         | 500~1000 倍         | -                | 植付前                    | 1 回                 | 20~30 分<br>間<br>苗基部浸<br>漬 | 4 回以内<br>(植付時まで<br>の処理は<br>1 回以内、<br>植付後は<br>3 回以内) |                |           |       |
|                      | 基腐病                                 |                    |                  |                        |                     | 30 分間<br>苗基部浸<br>漬        |   |                |           |       |
|                      | 黒斑病                                 | 種いも重の<br>0.4%      |                  | 種いも粉<br>衣              |                     |                           |   |                |           |       |
|                      | つる割病                                | 500~1000 倍         |                  | 20~40<br>mL/株          | 挿苗時                 | 株元灌注                      |   |                |           |       |
|                      | 斑点病                                 | 1000 倍             |                  | 100~300<br>L/10a       | 収穫 7 日前<br>まで       | 3 回<br>以内                 |   | 散布             |           |       |
| なす                   | 半身萎凋病                               | 500 倍              | 200~300<br>mL/株  | 定植後~<br>収穫 14 日前<br>まで | 3 回<br>以内           | 土壌灌注                      | 4 回以内<br>(種子粉衣は<br>1 回以内、<br>は種後は<br>3 回以内)         |                |           |       |
|                      |                                     | 1000 倍             | 400~600<br>mL/株  |                        |                     |                           |   |                |           |       |
|                      | 黒枯病<br>灰色かび病                        | 2000~3000 倍        | 100~300<br>L/10a | 収穫前日まで                 |                     | 散布                        |   |                |           |       |
|                      | 菌核病<br>褐紋病<br>ガム立枯病                 | 2000 倍             |                  |                        |                     |                           |   |                |           |       |
| みかん                  | そうか病<br>灰色かび病                       | 2000~3000 倍        | 200~700<br>L/10a | 収穫前日まで                 | 4 回<br>以内           | 散布                        | 4 回以内   |                |           |       |
|                      | 貯蔵病害(白かび病)                          | 4000 倍             |                  |                        |                     |                           |   |                |           |       |
| かんきつ<br>(みかんを<br>除く) | 貯蔵病害(青かび病)<br>貯蔵病害(緑かび病)            | 4000~6000 倍        |                  |                        | 200~700<br>L/10a    |                           | 収穫前日まで  | 2 回<br>以内      | 散布        | 2 回以内 |
|                      | 貯蔵病害(軸腐病)<br>貯蔵病害(炭疽病)<br>貯蔵病害(黒斑病) |                    |                  |                        |                     |                           |   |                |           |       |
|                      | 貯蔵病害(白かび病)                          |                    |                  |                        |                     |                           |   |                |           |       |
| しゃくやく<br>(薬用)        | 根黒斑病                                | 20 倍               | -                | 植付前                    | 1 回                 | 10 分間<br>苗基部浸<br>漬        | 9 回以内<br>(植付前まで<br>の処理は<br>1 回以内、<br>植付後は<br>8 回以内) |                |           |       |
|                      |                                     | 500 倍              |                  |                        |                     | 16 時間<br>苗基部浸<br>漬        |   |                |           |       |
|                      | 灰色かび病                               | 1000 倍             |                  |                        |                     | 100~300<br>L/10a          |   | 収穫 14 日前<br>まで | 8 回<br>以内 | 散布    |
| 野菜類                  | ガム菌による病害                            | 乾燥種子重量の<br>0.16%   | -                | は種前                    | 1 回                 | 種子処理機<br>による<br>種子粉衣      | 1 回   |                |           |       |

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社