

殺菌剤  
**バリダシン液剤5**  
バリダマイシン液剤

令和3年8月31日付けで以下の適用拡大が登録されました。

**【変更内容】**

- ・作物名「未成熟とうもろこし」、「ブロッコリー」、「うめ」を追加する。
- ・作物名「だいこん」の使用時期を「収穫21日前まで」から「収穫7日前まで」に変更する。
- ・作物名「レタス」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫前日まで」に変更する。
- ・作物名「非結球レタス」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫3日前まで」に変更する。
- ・作物名「ねぎ」のバリダマイシンを含む農薬の総使用回数を「2回以内（は種時の灌注は1回以内、散布及び株元散布は合計1回以内）」から「3回以内（は種時の灌注は1回以内、散布及び株元散布は合計2回以内）」に変更し、希釈倍数「500倍」の使用時期を「収穫21日前まで」から「収穫前日まで」、本剤の使用回数を「1回」から「2回以内」に変更する。
- ・作物名「にんにく」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫3日前まで」に変更する。
- ・作物名「みつば」の使用時期を「移植後 但し 収穫21日前まで、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで」から「移植後 但し 収穫7日前まで、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで」に変更する。
- ・作物名「かんきつ」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫7日前まで」に変更する。
- ・作物名「すもも」の使用時期を「収穫14日前まで」から「収穫3日前まで」に変更する。

前頁より続く

## 【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	パリダマイツを 含む農薬の 総使用回数
未成熟 とうもろこし	紋枯病	1000倍	100~300 L/10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内
ブロッコリー	黒腐病	800倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
うめ	かいよう病	500倍	200~700 L/10a	収穫7日前 まで	4回以内	散布	4回以内
だいこん	軟腐病	500倍	100~300 L/10a	収穫7日前 まで	4回以内	散布	4回以内
ねぎ	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	400倍	6L/m <sup>2</sup>	は種時	1回	灌注	3回以内 (は種時の灌注 は1回以内、 散布及び株元散 布は合計 2回以内)
	軟腐病	500倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	
	白絹病					株元散布	
レタス	すそ枯病 腐敗病 軟腐病	800倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内
非結球レタス				収穫3日前 まで			
にんにく	春腐病	800倍	100~300 L/10a	収穫3日前 まで	5回以内	散布	5回以内
みつば	立枯病	800倍	100~300 L/10a	育苗期 移植後 但し 収穫7日前 まで、 伏せ込み栽 培は伏せ込 み前まで	1回  3回以内	散布	4回以内 (育苗期は 1回以内、 移植後は 3回以内)
かんきつ	かいよう病	500倍	200~700 L/10a	収穫7日前 まで	4回以内	散布	4回以内
すもも	黒斑病	500倍	200~700 L/10a	収穫3日前 まで	4回以内	散布	4回以内

## 使用上の注意事項の変更

## 【変更後】

- ・うめ、かんきつのかいよう病に対しては効果がやや劣る場合があるので、他剤と輪番使用をするとより有効である。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

## 住友化学株式会社