農林水産省登録
第２１２２６号

殺虫殺菌剤

ダントツオリゼメート１０箱粒剤

クロチアニジン・プロベナゾール粒剤

令和3年10月27日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】
・作物名「稲（箱育苗）」に使用量「高密度には種する場合は１ｋｇ／１０ａ（育苗箱（３０×６０×３ｃｍ、使用土壌約５Ｌ）１箱当り５０～１００ｇ）」を追加する。
・作物名「稲（箱育苗）」のクロチアニジンを含む農薬の総使用回数「４回以内（移植時までの処理は１回以内、本田での散布、空中散布、無人ヘリ散布は合計３回以内）」を「４回以内（移植時までの処理は１回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計３回以内）」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝを含む農薬の総使用回数	ﾌﾟﾛﾍﾞﾅｿﾞｰﾙを含む農薬の総使用回数
稲（箱育苗）	いもち病 ｲﾈﾄﾞﾛｵｲﾑｼ ｲﾈﾐｽﾞｿﾞｳﾑｼ ｳﾝｶ類 ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲﾆｶﾒｲﾁｭｳ	育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50g 高密度には種する場合は1kg/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50～100g）	移植3日前～移植当日	1回	育苗箱の苗の上から均一に散布する。	4回以内（移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内）	2回以内（移植時までの処理は1回以内）

使用上の注意事項の変更

【追加事項】
・育苗箱（３０×６０×３ｃｍ、使用土壌約５Ｌ）１箱当りに乾籾として２００から３００ｇ程度を高密度には種する場合は、１０ａ当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が１ｋｇ／１０ａまでとなるよう、育苗箱１箱当りの薬量を５０から１００ｇまでの範囲で調整すること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社