

殺虫剤
ダントツ水溶剤
クロチアニジン水溶剤

令和3年10月27日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「稲（箱育苗）」の適用病害虫名「ウンカ類、ツマグロヨコバイ、フタオビコヤガ」に希釈倍数「高密度には種する場合は50g/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り2.5～5g（希釈倍数100～200倍）」を追加する。
- ・作物名「稲（箱育苗）」の適用病害虫名「イネドロオウムシ、イネミズゾウムシ」に希釈倍数「高密度には種する場合は50g/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り1.25～5g（希釈倍数100～400倍）」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	ウンカ類 ツマグロヨコバイ フタオビコヤガ	200倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り500mL	移植3日前 ～移植当日	1回	育苗箱の上から 均一に 散布する。	4回以内 (移植時 までの 処理は 1回以内、 本田での 散布、 空中散布、 無人航空機 散布は 合計 3回以内)
		高密度には種する場合は 50g/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り2.5～5g (希釈倍数 100～200倍))					
	200～400倍						
	高密度には種する場合は 50g/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り1.25～5g (希釈倍数 100～400倍))						

次頁へ続く

前頁より続く

使用上の注意事項の変更

【追加事項】

・育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当りに乾糶として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が50g/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を1.25から5gまでの範囲で調整すること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社