

殺虫剤
ダントツ箱粒剤
クロチアニジン粒剤

令和3年10月27日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

・作物名「稲（箱育苗）」に使用量「高密度には種する場合は1kg/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50～100g）」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネミズゾウムシ イネトモイシ コメイトウ フタホシコガ イネヒメコガリバエ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	移植3日前 ～移植当日	1回	育苗箱の上から 均一に 散布する。	4回以内 (移植時までの 処理は 1回以内、 本田での散布、 空中散布、 無人航空機 散布は 合計3回以内)
		高密度には種する場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り 50～100g)				
	イネコカムシ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	移植当日			
		高密度には種する場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り 50～100g)				

次頁へ続く

前頁より続く

使用上の注意事項の変更

【追加事項】

・育苗箱（30×60×3 cm、使用土壌約5 L）1箱当りに乾糶として200から300 g程度を高密度には種する場合は、10 a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が1 kg／10 aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を50から100 gまでの範囲で調整すること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社