

除草剤

ゼータプラス1キロ粒剤
フェンキノトリオン・プロピリスルフロンの粒剤

令和3年11月24日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「移植水稻」および「直播水稻」の使用法「湛水散布」に「無人航空機による散布」を追加し、「湛水散布又は無人航空機による散布」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数	プロピリスルフロンの総使用回数
移植水稻	一年生雑草 及び 多年生広葉雑草 エゾノヤブカガサ	移植時	1kg/10a	1回	田植同時 散布機で 施用	2回以内	2回以内
		移植直後～ バエ3.5葉期 ただし、 移植後30日まで					
直播水稻	一年生雑草 及び マツバイ ホトケルシ ミズガヤツリ ウリカ ヒルムシ セリ アミトノ藻類による 表層はく離	稲1葉期～ バエ3.5葉期 ただし、 収穫75日前まで	1kg/10a	1回	湛水散布 又は無人 航空機に よる散布	2回以内	2回以内

次頁へ続く

前頁より続く

使用上の注意事項の変更

【追加事項】

- ・ 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意を守ること。
 - ① 散布は散布機種種の散布基準に従って実施すること。
 - ② 専用の粒剤散布装置によって湛水散布すること。
 - ③ 事前に薬剤の物理性に合わせて粒剤散布装置のメタリング開度を調整すること。
 - ④ 散布薬剤の飛散によって他の植物に影響を与えないよう散布区域の選定に注意し、当該水田周辺部への飛散防止のため散布装置のインペラの回転数を調整し、ほ場の端から5m離れた位置からほ場内に散布すること。
 - ⑤ 水源池、飲料用水等に本剤が飛散、流入しないように十分注意すること。
- ・ 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意すること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社