

殺虫剤
ロディー乳剤
フェンプロパトリン乳剤

令和3年11月24日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「かんきつ」に適用病害虫名「アケビコノハ」および「ヒメエグリバ」を追加する。
- ・作物名「もも」に適用病害虫名「カメムシ類」を追加し、希釈倍数「2000倍」を「1000～2000倍」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フェンプロパトリンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	アケビコノハ ヒメエグリバ ミカンモグリガ チャノドアザミマ カメムシ類 アブラムシ類 ケキスイ類 ミカンダニ コアハムグリ ミドリヒメコバイ シクトリムシ類 ハマキムシ類 カネタキ ケムシ類	2000倍	200～700 L/10a	収穫7日前 まで	4回以内	散布	9回以内 (噴射は5回以内、 散布及びくん煙 は合計4回以内)
もも	カメムシ類 アブラムシ類 シクムシ類 モハムシガ アケグリバ アケビコノハ オケグリバ ヒメエグリバ	1000～ 2000倍		収穫前日 まで	5回以内		10回以内 (噴射は5回以内、 散布は5回以内)

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社