

除草剤  
住化バサグラン液剤(ナトリウム塩)  
ベンタゾン液剤

令和3年11月24日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「おうぎ」を追加する。
- ・作物名「たまねぎ」の使用時期「春播栽培の移植後6月上旬まで(雑草の3~4葉期)但し収穫30日前まで」を「春播栽培の移植後6月上旬まで 但し収穫30日前まで」に変更する。
- ・作物名「たまねぎ」の使用時期「秋播栽培の移植後生葉4葉期まで(雑草の3~4葉期)但し収穫30日前まで」を「秋播栽培の移植後生葉4葉期まで 但し収穫30日前まで」に変更する。
- ・作物名「らっきょう」の使用時期を「出芽後 但し収穫60日前まで」に変更する。
- ・作物名「いんげんまめ」の使用時期を「初生葉展開期~本葉抽出始期」に変更する。
- ・作物名「えんどうまめ」の使用時期を「3~6葉期 但し収穫70日前まで」に変更する。
- ・作物名「実えんどう」及び「さやえんどう」の使用時期を「3~6葉期 但し収穫40日前まで」に変更する。
- ・作物名「とうもろこし」及び「飼料用とうもろこし」の使用時期を「生育期 但し収穫50日前まで」に変更する。
- ・作物名「ソルガム」の使用時期を「生育期 但し収穫30日前まで」に変更する。
- ・作物名「麦類(小麦を除く)」の使用時期を「生育期 但し収穫90日前まで」に変更する。
- ・作物名「小麦」、「はとむぎ」及び「べにばないんげん」の使用時期を「生育期 但し収穫45日前まで」に変更する。

次頁へ続く

前頁より続く

## 【変更部分】

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用 方法	ベンザゾ ン を含む 農薬の総 使用回数		
			薬量	希釈水量					
たまねぎ	一年生 雑草 (イネ科 を除く)	春播栽培の 移植後6月上旬まで 但し 収穫30日前まで	60~120 mL/10a	70~100 L/10a	1回	雑草茎 葉散布 又は 全面散 布	1回		
		秋播栽培の 移植後生葉4葉期まで 但し 収穫30日前まで							
らっきょう		出芽後 但し 収穫60日前まで	100~200 mL/10a						
いんげんまめ		初生葉展開期~ 本葉抽出始期	50~70 mL/10a						
えんどうまめ		3~6葉期 但し 収穫70日前まで	100~200 mL/10a						
実えんどう さやえんどう		3~6葉期 但し 収穫40日前まで	100~200 mL/10a						
とうもろこし 飼料用とうもろこし		生育期 但し 収穫50日前まで	100~150 mL/10a						
ソルガム		生育期 但し 収穫 30 日前まで	100~150 mL/10a						
麦類 (小麦を除く)		生育期 但し 収穫90日前まで	100~200 mL/10a						
小麦		生育期 但し 収穫45日前まで	150 mL/10a						
はとむぎ		生育期 但し 収穫45日前まで	200 mL/10a						
おうぎ		生育期 但し 収穫30日前まで	100 L/10a					2回 以内	2回以内
べにばないんげん		生育期 但し 収穫45日前まで	100~200 mL/10a					70~100 L/10a	1回

次頁へ続く

前頁より続く

## 使用上の注意事項の変更

### 【変更事項】

- ・本剤は一年生広葉雑草に有効であるが、作物ごとに使用薬量等が異なるので、時期を失しないように、雑草茎葉にかかるよう均一に散布すること。

各作物の雑草への散布適期は以下のとおりである。

- ①らっきょう、えんどうまめ、実えんどう、さやえんどう、とうもろこし、飼料用とうもろこし、ソルガム、麦類(小麦を除く)、小麦、せり、おうぎ・・・・・・・・雑草3~6葉期
- ②べにばないんげん・・・・・・・・雑草の生育初期~6葉期
- ③たまねぎ・・・・・・・・雑草の3~4葉期
- ④いんげんまめ・・・・・・・・雑草の2~3葉期

### 【追加事項】

- ・おうぎに使用する場合、本剤は一時的には葉先の黄化等の薬害を生じることがあるので、特に天候等をよくみきわめてから散布すること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社