

殺菌剤  
スクレアフロアブル  
マンデストロビン水和剤

令和4年2月25日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「カリフラワー」を追加する。
- ・作物名「ブロッコリー」を追加する。
- ・作物名「たまねぎ」を追加する。
- ・作物名「ピーマン」を追加する。
- ・作物名「とうがらし類」を追加する。
- ・作物名「ほうれんそう」を追加する。
- ・作物名「いちご」を追加する。

【追加部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンデストロビンを含む農薬の総使用回数
カリフラワー	菌核病	2000倍	100~300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
ブロッコリー	菌核病						
たまねぎ	灰色腐敗病 小菌核病						
ピーマン	炭疽病 菌核病						
とうがらし類	炭疽病 菌核病						
ほうれんそう	萎凋病	1000倍	1L/m <sup>2</sup>	は種7日後まで	2回以内	灌注	2回以内
いちご	菌核病 うどんこ病	2000倍	100~300 L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内

使用上の注意事項の変更

【追加事項】

- ・乾燥が続く条件下においてほうれんそうに対し灌注で使用する場合、株立数減少などが起きることがあるので注意すること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社