

殺虫殺菌剤
プリンスリンバー箱粒剤
フィプロニル・フラメトピル粒剤

令和4年3月23日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「稲（箱育苗）」に使用量「高密度には種する場合は1kg/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50～100g）」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フィプロニルを含む農薬の総使用回数	フラメトピルを含む農薬の総使用回数
稲 （箱育苗）	紋枯病 ウカ類 イトメイシ イトミゾウムシ コブメイガ ニカメイユウ	育苗箱 （30×60×3cm、 使用土壌約5L） 1箱当り50g	移植3日前 ～当日	1回	育苗箱の 上から 均一に 散布する。	1回	2回以内 （移植時 までの 処理は 1回以内）
		高密度に は種する場合は 1kg/10a （育苗箱 （30×60×3cm、 使用土壌約5L） 1箱当り 50～100g）					

使用上の注意事項の変更

【追加事項】

- ・育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当りに乾粒として200から300g程度を高密度には種する場合は、10a当りの育苗箱数に応じて、本剤の使用量が1kg/10aまでとなるよう、育苗箱1箱当りの薬量を50から100gまでの範囲で調整すること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社