

除草剤
兆フロアブル
ピラクロニル水和剤

令和4年3月23日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「移植水稻」に適用雑草名「アオミドロ・藻類による表層はく離」を追加する。
- ・適用雑草名のうち「水田一年生雑草」を「一年生雑草」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ピラクロニルを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
移植水稻	一年生雑草 及び マツバイ 柵刈 ヘラモダカ ウリカ ヒルムシ オモダカ クダマ コキヤガラ アオミドロ・藻類による表層はく離	移植時	500ml /10a	—	1回	田植同時 散布機で 施用	2回以内
		植代後～移植7日前又は 移植直後～ ノビエ1.5葉期 ただし 移植後30日まで				原液湛水 散布又は 水口施用	
直播水稻	一年生雑草 及び マツバイ 柵刈 ウリカ ヒルムシ	湛水直播のは種直後～稲 出芽前 ただし 収穫60日前まで	100L /10a			落水散布	
		湛水直播の 稲出芽始期～ ノビエ1.5葉期 ただし 収穫60日前まで				湛水散布	

次頁へ続く

前頁より続く

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ピラコニルを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
ひえ(水田移植栽培)	一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ヒルムシロ	移植後5日～ ノビエ1.5葉期 ただし 収穫90日前まで	500ml /10a	—	2回 以内	原液湛水 散布	2回以内

使用上の注意事項の変更

【変更事項】

- ・本剤は雑草の発生前から発生始期に有効なので、ノビエの1.5葉期までに時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布するように注意すること。ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、オモダカでは発生始期まで、ヒルムシロでは発生期まで、クログワイ、コウキヤガラでは発生前、アオミドロ・藻類による表層はく離では発生前が本剤の散布適期である。また、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、藻類による表層はく離は発生期間が長く遅い発生のもので十分効果を示さない場合があるので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用すること（但し、オモダカは有効な前処理剤または後処理剤）。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社