

殺虫剤
ディアナSC
スピネトラム水和剤

令和4年4月20日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「さやいんげん」を追加し、それに伴い、作物名「豆類（未成熟）」を「豆類（未成熟、ただし、さやいんげんを除く）」に変更する。
- ・作物名「食用ミニバラ」を追加する。
- ・作物名「あずき」の適用病害虫名「アズキノメイガ」の希釈倍数「2500～5000倍」を「2500～7500倍」に変更する。
- ・作物名「だいこん」に適用病害虫名「キスジノミハムシ」、希釈倍数「2500倍」を追加する。
- ・作物名「しゅんぎく」に適用病害虫名「ハクサイダニ」を追加する。
- ・作物名「ほうれんそう」の希釈倍数「2500～5000倍」に適用病害虫名「ハクサイダニ」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	SP [®] 補正を含む農薬の総使用回数
さやいんげん	アザミヤ類 ハモグリバエ類 アズキノメイガ ハモシトウ	2500～5000倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
豆類 (未成熟、ただし、 さやいんげんを除く)	アザミヤ類 ハモグリバエ類 ハモシトウ						
食用ミニバラ	コナジラミ類	2500倍					
	アザミヤ類 材カコガ	2500～5000倍					
あずき	アザミヤ類 ハモグリバエ類 ハモシトウ						
	アズキノメイガ						
だいこん	キスジノミハムシ	2500倍					
	ウバ類 ハモグリバエ類 アムシ カブラバチ コガ ハマダラメイガ ヨトウムシ	2500～5000倍					

次頁へ続く

前頁より続く

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	SP補正を含む農薬の総使用回数
しゅんぎく	ハモグリバエ類 オオカブト ハクサイダニ ハスモンヨトウ	2500~5000倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
ほうれんそう	ハモグリバエ類 シロヒメメイガ ハクサイダニ ハスモンヨトウ	2500~5000倍					
	ホウレンソウウケガコダニ	2500倍					

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社