

植物成長調整剤
スミセブンP液剤
ウニコナゾールP液剤

令和4年5月20日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「キャベツ」および「レタス」の使用液量「トレー（30cm×60cm）1枚当り50～100mL」を「セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊（30×60cm、使用土壌約1.5～4L）当り50～100mL」に変更する。
- ・作物名「トマト」を追加する。

【変更部分】

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ウニコナゾールPを含む農薬の総使用回数
キャベツ	育苗期の伸長抑制	250～1000倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm、使用土壌約1.5～4L)当り50～100mL	定植前 子葉展開期～ 本葉3葉期	1回	茎葉散布	—	1回
レタス				は種後出芽前		土壌灌注		
		定植前 子葉展開期～ 本葉2葉期		茎葉散布				
		は種後出芽前		土壌灌注				
トマト		100～200倍		定植前 子葉展開期～ 本葉2葉期		茎葉散布		

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。