

殺菌剤
カナメフロアブル
インピルフルキサム水和剤

令和4年9月7日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「あずき」および「そらまめ」を追加し、それに伴い、作物名「豆類（種実、ただし、らっかせいを除く）」を「豆類（種実、ただし、あずき、そらまめ、らっかせいを除く）」に変更する。
- ・作物名「未成熟そらまめ」を追加し、それに伴い、作物名「豆類（未成熟、ただし、さやえんどうを除く）」を「豆類（未成熟、ただし、さやえんどう、未成熟そらまめを除く）」に変更する。
- ・作物名「ねぎ」の使用方法「散布」、希釈倍数「4000倍」に適用病害虫名「葉枯病」を追加する。
- ・作物名「チューリップ」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	インピルフルキサムを含む農業の総使用回数
豆類 (種実、ただし、あずき、そらまめ、らっかせいを除く)	菌核病 灰色かび病	4000倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	4回以内	散布	4回以内
あずき そらまめ	菌核病 さび病 灰色かび病						
豆類 (未成熟、ただし、さやえんどう、未成熟そらまめを除く)	菌核病 灰色かび病						
未成熟そらまめ	菌核病 さび病 灰色かび病						
ねぎ	黒斑病 葉枯病	4000~ 8000倍				株元散布	
	さび病						
	黒腐菌核病	4000倍					
	白絹病	4000~ 8000倍					
チューリップ	皮腐病 葉腐病	100~200倍	-	植付前	1回	15分間 球根浸漬	1回

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと

住友化学株式会社