

殺菌剤
ミリオネアフロアブル
インピルフルキサム水和剤

令和4年9月7日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「小麦」を追加し、それに伴い、作物名「麦類」を「麦類（小麦を除く）」に変更する。
- ・作物名「あずき」および「そらまめ」を追加し、それに伴い、作物名「豆類（種実、ただし、らっかせいを除く）」を「豆類（種実、ただし、あずき、そらまめ、らっかせいを除く）」に変更する。
- ・作物名「未成熟そらまめ」を追加し、それに伴い、作物名「豆類（未成熟、ただし、さやえんどうを除く）」を「豆類（未成熟、ただし、さやえんどう、未成熟そらまめを除く）」に変更する。
- ・作物名「ねぎ」の使用方法「散布」、希釈倍数「4000倍」に適用病害虫名「葉枯病」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	インピルフルキサムを含む農薬の総使用回数
麦類 (小麦を除く)	雪腐小粒菌核病	2000～4000倍	60～150 L/10a	根雪前	2回以内	散布	4回以内 (根雪前は2回以内、 根雪後は2回以内)
	うどんこ病	4000倍		収穫7日前まで			
	赤さび病	4000～8000倍		根雪前			
小麦	雪腐大粒菌核病	2000～4000倍		収穫7日前まで			
	雪腐小粒菌核病	4000倍					
	赤さび病	4000～8000倍					
豆類 (種実、ただし、あずき、そらまめ、らっかせいを除く)	菌核病 灰色かび病	4000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	4回以内	4回以内	
あずき そらまめ	菌核病 さび病 灰色かび病						

次頁へ続く

前頁より続く

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イピルホサムを含む農薬の総使用回数
豆類 (未成熟、ただし、 さやえんどう、 未成熟そらまめ を除く)	菌核病 灰色かび病	4000 倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	4 回 以内	散布	4 回以内
未成熟そらまめ	菌核病 さび病 灰色かび病						
ねぎ	黒斑病 葉枯病	4000~ 8000 倍				株元散布	
	さび病						
	黒腐菌核病	4000 倍					
	白絹病	4000~ 8000 倍					

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社