

除草剤

ゼータプラスフロアブル

フェンキノトリオン・プロピリスルフロン水和剤

令和4年11月9日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「移植水稻」の使用時期「移植後3日～ノビエ3.5葉期 ただし、移植後30日まで」を「移植後3日～ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数	プロピリスルフロンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	一年生雑草 及び 多年生広葉雑草 エゾノサヤヌカグサ	移植後3日～ ノビエ4葉期 ただし、 移植後30日 まで	500mL/10a	1回	原液湛水散布、 水口施用 又は 無人航空機 による滴下	2回以内	2回以内

使用上の注意事項の変更

【変更事項】

- ・本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの4葉期までに時期を失ないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布するようにすること。ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカは3葉期まで、ミズガヤツリは草丈20cm以下まで、ヒルムシロは発生盛期まで、セリは再生期まで、エゾノサヤヌカグサは発生始期まで、オモダカは発生前からヘラ葉期まで、クログワイは発生前から草丈10cm以下まで、コウキヤガラは発生前から草丈35cm以下まで、シズイは草丈3cm以下までが本剤の散布適期である。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社