

除草剤

ゼータプラスジャンボ
フェンキノトリオン・プロピリスルフロン粒剤

令和4年12月21日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「移植水稻」の使用時期「移植後3日～ノビエ3.5葉期 ただし、移植後30日まで」を「移植後3日～ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで」に変更する。
- ・作物名「移植水稻」の使用方法に「水口施用」を追加し、「水口施用又は水田に小包装（パック）のまま投げ入れる。」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数	プロピリスルフロンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	一年生雑草 及び 多年生広葉雑草 イノヤマガサ	移植後3日～ ノビエ4葉期 ただし、 移植後30日 まで	小包装（パック） 10個（200g）/10a	1回	水口施用 又は 水田に小包装 （パック）のまま 投げ入れる。	2回以内	2回以内

使用上の注意事項の変更

【変更事項】

- ・本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの4葉期までに時期を失ないように使用すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に使用するようすること。ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカは3葉期まで、ミズガヤツリは草丈25cm以下まで、ヒルムシロは発生盛期まで、セリは再生期まで、エゾノサヤヌカグサは2葉期まで、オモダカは発生前からヘラ葉期まで、クログワイは発生前から草丈15cm以下まで、コウキヤガラは発生始期から草丈35cm以下まで、シズイは草丈3cm以下までが本剤の散布適期である。

【追加事項】

- ・水口施用の場合は、あらかじめ2cm程度水深を確保した状態で、入水時に本剤を水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させ、施用後田面水が通常の湛水状態（3～5cm）に達した時に必ず水を止め、田面水があふれ出ないように注意すること。散布後、少なくとも3～4日間は通常の湛水状態（3～5cm）を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないこと。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社