

## 除草剤

**ゼータプラス200FG**  
フェンキノトリオン・プロピリスルフロン粒剤

令和4年12月21日付けで以下の適用拡大が登録されました。

## 【変更内容】

- ・作物名「移植水稻」の使用時期「移植後3日～ノビエ3.5葉期 ただし、移植後30日まで」を「移植後3日～ノビエ4葉期 ただし、移植後30日まで」に変更する。
- ・作物名「移植水稻」および「直播水稻」の使用方法に「水口施用」を追加し、「湛水散布、湛水周縁散布、水口施用又は無人航空機による散布」に変更する。

## 【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	フェンキノトリオンを含む農薬の総使用回数	プロピリスルフロンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	一年生雑草 及び 多年生広葉雑草 エゾノサヤヌカグサ	移植後3日～ ノビエ4葉期 ただし、 移植後30日 まで	200g/10a	1回	湛水散布、 湛水周縁散布、 水口施用 又は 無人航空機 による散布	2回以内	2回以内
直播水稻	一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ アオミドロ・藻類による 表層はく離	稲1葉期～ ノビエ3.5葉期 ただし、 収穫75日前 まで					

## 使用上の注意事項の変更

## 【変更事項】

- ・本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの4葉期までに時期を失しないように使用すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に使用するようすること。ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカは3葉期まで、ミズガヤツリは草丈25cm以下まで、ヒルムシロは発生盛期まで、セリは再生期まで、エゾノサヤヌカグサは2葉期まで、オモダカは発生前からヘラ葉期まで、クログワイは発生前から草丈15cm以下まで、コウキヤガラは発生始期から草丈35cm以下まで、シズイは草丈3cm以下までが本剤の散布適期である。

次頁へ続く

前頁より続く

**【追加事項】**

- ・水口施用の場合は、あらかじめ2 cm程度水深を確保した状態で、入水時に本剤を水口に施用し、流入水とともに水田全面に拡散させ、施用後田面水が通常の湛水状態（3～5 cm）に達した時に必ず水を止め、田面水があふれ出ないように注意すること。散布後、少なくとも3～4日間は通常の湛水状態（3～5 cm）を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないこと。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。