

殺菌剤  
ベンレート水和剤  
ベノミル水和剤

令和5年1月25日付けで以下の適用拡大が登録されました。

## 【変更内容】

- ・作物名「せんぶり」および「とりかぶと（薬用）」を追加する。
- ・作物名「稲（箱育苗）」の適用病害虫名「いもち病」、希釈倍数または使用量「500～1000倍」の使用時期「は種時～は種7日後頃」を「は種時～は種14日後まで」に変更する。
- ・作物名「ブロッコリー」に適用病害虫名「根朽病」、希釈倍数「2000倍」を追加する。
- ・作物名「ズッキーニ」に適用病害虫名「つる枯病」を追加する。
- ・作物名「うど」の使用時期「種株冷蔵保存前」を「定植前」に変更する。
- ・作物名「しゃくやく（薬用）」の適用病害虫名「灰色かび病」の本剤の使用回数「8回以内」を「10回以内（1年間に2回以内）」に変更し、ベノミルを含む農薬の総使用回数「9回以内（植付前までの処理は1回以内、植付後は8回以内）」を「11回以内（植付前までの処理は1回以内、植付後は10回以内（但し、1年間に2回以内）」に変更する。

## 【変更部分】

| 作物名           | 適用病害虫名 | 希釈倍数<br>または<br>使用量 | 使用液量             | 使用時期   | 本剤の<br>使用回数             | 使用方法  | ベノミルを<br>含む農薬の<br>総使用回数 |
|---------------|--------|--------------------|------------------|--------|-------------------------|-------|-------------------------|
| せんぶり          | さび病    | 2000倍              | 100～300<br>L/10a | 収穫前日まで | 12回以内<br>(1年間に<br>6回以内) | 散布    | 12回以内<br>(1年間に<br>6回以内) |
| とりかぶと<br>(薬用) | 白絹病    | 種いも重量の<br>0.4%     | -                | 植付前    | 1回                      | 種いも粉衣 | 1回                      |

次頁へ続く

前頁より続く

| 作物名              | 適用病害虫名      | 希釈倍数<br>または<br>使用量                         | 使用液量                                    | 使用時期           | 本剤の<br>使用回数             | 使用方法          | ペノシルを<br>含む農薬の<br>総使用回数   |
|------------------|-------------|--|---|----------------|-------------------------|---------------|---|
| 稲(箱育苗)           | いもち病        | 育苗箱<br>(30×60×3cm<br>使用土壌約5L)<br>1箱当り1g    | -                                       | は種前            | 1回                      | 床土混和          | 2回以内<br>(種子への<br>処理は<br>1回以内、<br>床土への<br>混和は<br>1回以内)                   |
|                  |             | 1000倍                                      | 育苗箱<br>(30×60×3cm<br>使用土壌約5L)<br>1箱当り1L | は種時～<br>は種7日後頃 | 2回以内                    | 灌注            |   |
|                  | 500～1000倍   | 育苗箱<br>(30×60×3cm<br>使用土壌約5L)<br>1箱当り500mL | は種時～<br>は種14日後<br>まで                    |                |                         |               |   |
|                  |             |  | は種時                                     |                |                         |               |   |
| 苗立枯病<br>(フザリウム菌) | 1000倍       | 育苗箱<br>(30×60×3cm<br>使用土壌約5L)<br>1箱当り1L    | は種時1回<br>又は<br>は種時とは種<br>7日後頃の2回        |                |                         |               |   |
| ブロッコリー           | 根朽病         | 2000倍                                      | 100～300<br>L/10a                        | 収穫7日前<br>まで    | 3回以内                    | 散布            | 4回以内<br>(種子粉衣は<br>1回以内、<br>は種後は<br>3回以内)                                |
|                  | 菌核病         | 2000～4000倍                                 |   | 収穫前日<br>まで     |                         |               |   |
| ズッキーニ            | 菌核病<br>つる枯病 | 3000倍                                      |   |                |                         |               |   |
| うど               | 菌核病         | 500倍                                       | -                                       | 定植前            | 1回                      | 30分間<br>種株浸漬  | 1回  |
| しゃくやく<br>(薬用)    | 根黒斑病        | 20倍  | -                                       | 植付前            | 1回                      | 10分間<br>苗基部浸漬 | 11回以内<br>(植付前まで<br>の処理は<br>1回以内、<br>植付後は<br>10回以内<br>(但し、1年間に<br>2回以内)) |
|                  |             | 500倍                                       |   |                |                         | 16時間<br>苗基部浸漬 |   |
|                  | 灰色かび病       | 1000倍                                      | 100～300<br>L/10a                        | 収穫14日前<br>まで   | 10回以内<br>(1年間に<br>2回以内) | 散布            |   |

使用上の注意事項の変更

【追加事項】

- ・なしの胴枯病・枝枯病に対してマシン油乳剤で希釈して塗布を行う場合、マシン油乳剤はベンレート水和剤に加用の登録のある剤を使用し、マシン油乳剤の注意事項を確認のうえ使用すること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社