

除草剤

STトレファノサイド乳剤

トリフルラリン乳剤

令和5年2月22日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「ほうきぎ」を追加する。
- ・作物名「小麦」、適用雑草名「一年生雑草（ツユクサ科、ヤツリガサ科、カキ科、アブナ科を除く）」の使用時期「は種後出芽前（雑草発生前）」及び使用方法「全面土壌散布」を使用時期「は種後出芽前～3葉期（雑草発生前～雑草発生始期）」及び使用方法「雑草茎葉散布又は全面土壌散布」に変更する。
- ・作物名「麦類（小麦を除く）」の使用時期「は種後出芽前（雑草発生前）」及び使用方法「全面土壌散布」を使用時期「は種後出芽前～3葉期（雑草発生前～雑草発生始期）」及び使用方法「雑草茎葉散布又は全面土壌散布」に変更する。

【変更部分】

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	トリフルラリンを含む農薬の総使用回数		
				薬量	希釈水量						
小麦	—	一年生雑草 (ツユクサ科、ヤツリガサ科、カキ科、アブナ科を除く)	は種後出芽前～3葉期 (雑草発生前～雑草発生始期)	200～300 mL/10a	100 L/10a	2回 以内	雑草茎葉散布 又は 全面土壌散布	—	2回 以内		
		一年生イネ科雑草	小麦出芽後～3葉期 (イネ科雑草1葉期まで)					北海道			
麦類 (小麦を除く)	—	一年生雑草 (ツユクサ科、ヤツリガサ科、カキ科、アブナ科を除く)	生育期 (雑草発生前) 但し、 収穫45日前まで				全面土壌散布	—		全面土壌散布	—
			は種後出芽前～3葉期 (雑草発生前～雑草発生始期)								
ほうきぎ	—	—	定植後 但し、 定植14日後まで	—	—	1回	畦間土壌散布	—	1回		

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社