

殺虫剤
ディアナSC
スピネトラム水和剤

令和5年3月8日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「とうがん」を追加する。
- ・作物名「かんしょ」に適用病害虫名「ヒルガオハモグリガ」を追加する。
- ・作物名「非結球あぶらな科葉菜類（こまつな、チンゲンサイ、なばな類を除く）」、「チンゲンサイ」および「なばな類」に適用病害虫名「アザミウマ類」を追加する。
- ・作物名「ブロッコリー」に適用病害虫名「シロイチモジヨトウ」を追加する。
- ・作物名「しゅんぎく」に適用病害虫名「アザミウマ類」を追加する。
- ・作物名「らっきょう」の使用方法「散布」に適用病害虫名「ハモグリバエ類」を追加する。
- ・作物名「セルリー」に適用病害虫名「ハモグリバエ類」を追加する。
- ・作物名「すいか」の希釈倍数「2500～5000倍」に適用病害虫名「ハスモンヨトウ」を追加する。
- ・作物名「ほうれんそう」の希釈倍数「2500～5000倍」に適用病害虫名「アザミウマ類」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｽﾋﾞ補払を含む農薬の総使用回数
とうがん	アザミウマ類	2500倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
かんしょ	カジロシバ ハスモンヨトウ	2500～5000倍					
	ヒルガオハモグリガ	2500倍					
非結球あぶらな科葉菜類 (こまつな、チンゲンサイ、 なばな類を除く)	アザミウマ類 コガ ハスモンヨトウ	2500～5000倍					
チンゲンサイ	アザミウマ類 ハモグリバエ類 アムシ コガ						
	ハマダラメイガ ハスモンヨトウ ヨウムシ						
なばな類	アザミウマ類 コガ ハクサイダニ ハスモンヨトウ						

次頁へ続く

前頁より続く

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｽﾍﾞ補正を含む農薬の総使用回数
ブロッコリー	アザミヤ類 ウバ類 アムシ 材バコガ コガ シロイモジヨウ ハイマダラメイガ ハモンヨウ ヨトウムシ	2500~5000倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	2回 以内	散布	3回以内 (定植時 までの 処理は 1回以内、 定植後の 散布は 2回以内)
しゅんぎく	アザミヤ類 ハモグリバエ類 材バコガ ハクサイダニ ハモンヨウ						2回以内
らっきょう	ネメトキ類	2500倍	—	植付前	1回	30分間 種球浸漬	3回以内 (種球浸漬は 1回以内、 散布は 2回以内)
	アザミヤ類 ハモグリバエ類	2500~5000倍					
セルリー	ハモグリバエ類 ハモンヨウ						
すいか	コナジラミ類	2500倍					
	アザミヤ類 ウバ類 材バコガ ハモンヨウ	2500~5000倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	2回 以内	散布	2回以内
ほうれんそう	ハクサイダニ	2500倍					
	アザミヤ類 ハモグリバエ類 シロヒメメイガ ハクサイダニ ハモンヨウ	2500~5000倍					

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社