

## 殺菌剤

## S T ダコニール 1 0 0 0

## TPN水和剤

令和5年3月8日付けで以下の適用拡大が登録されました。

## 【変更事項】

- ・作物名「トマト」に、適用病害虫名「斑点病」を追加する。
- ・作物名「トマト」に、適用病害虫名「うどんこ病」、希釈倍数「33倍」、使用液量「10L/10a」、使用時期「収穫前日まで」、本剤の使用回数「4回以内」、使用方法「常温煙霧」、TPNを含む農薬の総使用回数を「6回以内（土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内）」を追加する。
- ・作物名「せんぶり」、適用病害虫名「さび病」、希釈倍数「1000倍」、使用液量「100～300L/10a」、使用時期「収穫7日前まで」、本剤の使用回数「12回以内（1年間に6回以内）」、使用方法「散布」、TPNを含む農薬の総使用回数「12回以内（1年間に6回以内）」を追加する。
- ・作物名「にんじん」に、希釈倍数「8倍」、使用液量「1.6L/10a」、使用時期「収穫7日前まで」、本剤の使用回数「5回以内」、使用方法「無人航空機による散布」を追加する。
- ・作物名「にんじん」に、希釈倍数「16倍」、使用液量「3.2L/10a」、使用時期「収穫7日前まで」、本剤の使用回数「5回以内」、使用方法「無人航空機による散布」を追加する。

## 【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
トマト	疫病、輪紋病、葉かび病、炭疽病、灰色かび病、すすかび病、うどんこ病、褐色輪紋病、斑点病	1000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	6回以内 (土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内)
せんぶり	さび病	1000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	12回以内 (1年間に6回以内)		12回以内 (1年間に6回以内)
にんじん	黒葉枯病	1000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	5回以内	無人航空機による散布	5回以内 (種子への吹き付け処理は1回以内)
		8倍	1.6L/10a				
		16倍	3.2L/10a				

次頁へ続く

前頁より続く

常温煙霧として使う場合

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数
トマト	温室、ガラス室、ビニールハウス等密閉できる場所	すすかび病、葉かび病、褐色輪紋病、うどんこ病	33倍	10L/10a	収穫前日まで	4回以内	常温煙霧	6回以内 (土壌灌注は2回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計4回以内)

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社