

殺菌剤
カナメフロアブル
インピルフルキサム水和剤

令和5年3月22日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「だいず」を追加し、それに伴い、作物名「豆類（種実、ただし、あずき、そらまめ、らっかせいを除く）」を「豆類（種実、ただし、あずき、そらまめ、だいず、らっかせいを除く）」に変更する。
- ・作物名「りんどう」を追加する。
- ・作物名「かんきつ」の希釈倍数「4000倍」に適用病害虫名「黒点病」を追加する。
- ・作物名「かき」に適用病害虫名「灰色かび病」および「落葉病」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	インピルフルキサムを含む農薬の総使用回数
だいず	白絹病	4000倍	100~300 L/10a	収穫前日まで	4回以内	株元散布	4回以内
豆類 (種実、ただし、 あずき、そらまめ、 だいず、らっかせいを除く)	菌核病 灰色かび病			発病初期		散布	
りんどう	黒斑病		200~700 L/10a	収穫前日まで	3回以内		3回以内
かんきつ	黒点病 そうか病	4000~ 8000倍					
	灰色かび病	4000倍					
かき	うどんこ病 灰色かび病 落葉病	4000倍					

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと

住友化学株式会社