

殺虫殺菌剤  
**アレスモンガレス箱粒剤**  
オキサゾスルフィル・インピルフルキサム粒剤

令和5年8月23日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

・作物名「稲（箱育苗）」の使用方法「育苗箱の床土または覆土に均一に混和する。」に適用病害虫名「イネヒメハモグリバエ」を追加し、それに伴い、使用方法「育苗箱の覆土に均一に混和する。」を「育苗箱の床土または覆土に均一に混和する。」に統合し、削除する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキサゾスルフィルを含む農薬の総使用回数	インピルフルキサムを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	紋枯病 イネヒメハモグリバエ イネミズウムシ コブノメイガ ツマグロヨコバイ コメテウ フタヒコヤガ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	は種前	1回	育苗箱の 床土または 覆土に均一に 混和する。	1回	1回
		高密度に は種する場合は 1kg/10a(育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50~100g)					
		育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	は種時 (覆土前) ~移植当日		育苗箱の 上から均一に 散布する。		
		高密度に は種する場合は 1kg/10a(育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50~100g)					

次頁へ続く

前頁より続く

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チザブスルフイルを含む農薬の総使用回数	インピルキザムを含む農薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	イネカバエ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	移植当日	1回	育苗箱の上から均一に 散布する。	1回	1回
		高密度に は種する場合は 1kg/10a(育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50~100g)					

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

住友化学株式会社