

殺菌剤
カナメフロアブル
インピルフルキサム水和剤

令和5年11月7日付けで以下の適用拡大が登録されました。

【変更内容】

- ・作物名「結球あぶらな科葉菜類（はくさい、キャベツを除く）」、「はくさい」および「キャベツ」を追加する。
- ・作物名「ブロッコリー」を追加する。
- ・作物名「レタス類」を追加する。
- ・作物名「にんじん」を追加する。
- ・作物名「トマト」を追加する。
- ・作物名「ミニトマト」を追加する。
- ・作物名「きゅうり」を追加する。
- ・作物名「小粒核果類」を追加する。
- ・作物名「おうとう」を追加する。
- ・作物名「いちご」を追加する。
- ・作物名「ばれいしょ」に適用病害虫名「夏疫病」、使用方法「散布」を追加し、インピルフルキサムを含む農薬の総使用回数「1回」を「4回以内（種いもへの処理は1回以内、植付後は3回以内）」に変更する。

次頁へ続く

前頁より続く

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イピルホキサムを含む農薬の総使用回数
結球あぶらな科 葉菜類(はくさい、 キャベツを除く)	菌核病	4000 倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	3 回以内
はくさい	菌核病 尻腐病						
キャベツ	菌核病 株腐病						
ブロッコリー	菌核病 黒すす病						
レタス類	灰色かび病 菌核病 すす枯病						
にんじん	斑点病						
トマト ミニトマト	うどんこ病 灰色かび病 菌核病 葉かび病 すすかび病	200~700 L/10a	4 回以内	4 回以内			
きゅうり	うどんこ病 菌核病 灰色かび病						
小粒核果類	黒星病 すす斑病(うめ) 灰星病						
おうとう	灰星病	100~300 L/10a	3 回以内	3 回以内			
いちご	うどんこ病 灰色かび病						
ばれいしょ	黒あざ病	400 倍	-	植付前	1 回	種いも 瞬間浸漬	4 回以内 (種いもへの 処理は 1 回以内、 植付後は 3 回以内)
	夏疫病	4000 倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと

住友化学株式会社